











TOURNEFORTIUS

CONTRACTUS,

*SUB FORMA*

TABULARUM

*SISTENS*

INSTITUTIONES

EI HERBARIÆ

JUXTA METHODUM MODERNORUM,

*CUM*

LABORATORIO

PARISIENSI

EJUSDEM AUTORIS.

*ACCEDIT*

MATERIA MEDICA

*A PAULO HERMANNO*

IN CERTAS CLASSES CHARACTERISTICAS REDACTA,

*CUM*


DUPLICI SCHEMATISMO,

EXCURSIONIBUS BOTANICIS ET HERBARIIS VIVIS  
CONFICIENDIS INSERVIENTE.

*ACCURANTE*

CHRISTOPHORO BERNHARDO VALENTINI.

M. B. Fil.



*FRANCOFURTI AD MOENUM,*

PROSTAT APUD JOHANNEM PHILIPPUM ANDREÆ.

ANNO MDCCXV.



W 13 51 A 1141 A

254017 MET 124  
3015 5815 11

0191 5 1108 A

ORIT  
0111 1111





## P R Æ F A T I O.

**B**otanicos Studium ipsamque Rem Herbariam à tempore *Dioscoridis* exiguum vel omninò nullum incrementum summissè, non sine causâ suo quondam tempore conquestus est *Helmontius*. Nostris verò annis si rediret nunquam satis laudandum hoc Scholarum suscitabulum, nullus dubito, quin de statu Herbariorum exclamaturus sit :

*quantum mutatus ab illo !*

Equidem negari nequit Antiquissimos, circa corticem magis quàm nucleum versando, de solis nominibus, non verò de solidâ & distinctâ herbarum notitia fuisse sollicitos, ut è *Galenis*, *Aetii*, *Aegineta*, *Plinio* & aliorumque scriptis elucescit : & quamvis genuinus *Plinii* interpretes *D.* & *Dodonaus*, *Ruellius*, *Spigelinus* fratresq; *Bauhini* exactiore Historiam meditati partim, partim & aggressi sint, è tanto tædioso se extricare non potuerunt, quàm filo Modernorum Aristotelis Chaos informe & scopas ferè dissolutas posteris reliquerunt. Verò *Fabius Columna* & *Andreas Casalpini* tot plantarum inordinatas classes certaue genera reduxerunt, eorumque vestigia *M.*, *Hermanus*, *Ammannus*, *Rivinus*, *Tournefort*, & alii pressius persequuti sunt, dici non potest, quanta nunc facilitate, quantoque compendio vastissimus rei herbariæ campus absolvi & percurri possit ; & quamvis adhuc aliqua in methodo illorum discrepantia occurrat, ita ut hi genera plantarum è floribus, illi ex seminibus eorumque capsulis, isti mox è floribus, mox è seminibus & fructibus, alii denique ex omnibus simul partibus sumenda esse suadeant, discrimen tamen illud ita comparatum est, ut ceu bivia aut trivium ad regiam tandem viam redeuntia ad eundem Botanophilos scopum, h. e. solidam plantarum notitiam & dignotionem, deducere valeant. Hodiegi loco servient *Institutiones Rei Herbariæ Josephi Pitton de Tournefort*, Aquisgranensis, Doctoris Medici Parisiensis, Academiae Regiæ Scientiarum Socii, & in Horto Regio Botanices Professoris, qui solertia laboreque indicibili notas plantarum características in figuris æneis politissimis tam clarè & distinctè omnium oculis exposuit, ut fungum pro cerebro & peponem pro corde habere dixeris, qui non statim è primò illarum intuitu hanc Modernorum methodum addiscere, plantarumque genera ex amussi distinguere valeat, dummodo vulgare & cumprimis officinalium notitiam, per crebriores Excursiones Botanicas & autopsiam, sibi priùs comparaverit.



Quandoquidem verò liber hic ita comparatus sit, ut partim ob nimium, quo venit, pretium ab omnibus Philiatris minus coëmi, partim ob utriusque voluminis molem in excursionibus Botanicis, quas Herbationes vocant, ruri per montes, sylvas & campos absque molestia circumportari non possit; hinc filio meo, natu majori, *Christophoro Bernhardo Valentini*, animum ad studium hocce applicanti, nuper autor fui, ut nucleum & medullam quasi extrahendo quasvis Plantarum Classes ex Autore sic in Tabulis disponderet, ut uno statim intuitu omnibus illarum generibus (literis obliquis seu cursivis expressis) ob oculos positis species subalternatæ (hinc inde quoque adjectæ) eò facilius addisci & distingui possint. Ne verò sterilis sit comparata inde plantarum notitia, suasi insuper, ut notas characteristicas, quæis universam Materiam Medicam distinxit Celeberrimus *Paulus Hermani* in *Collegio MSC.* à multis in pretio habito, similibus in Tabulis distingueret, ut simul plantarum vires, à *Simone Paulli* in *Quadripartito Botanico* & *Joh. Rajo* in *Historia Plantarum* longè elegantius quàm in Herbariis *Theodori Tabernamontani*, *Matthioli*, *Loniceri*, *Tragi*, *Lobelii*, *Pancovii*, aliorumque traditas, addiscere & in futurum usum medicum sibi firmiter imprimere valeret. Utroque instituto hoc ex voto succedente, permisi tandem ut *Præparationes Chymicas*, à *Turnesfortio* in Collegio publico olim traditas, cum annotationibus & ætiologiis à me adjectis, subjungendo panopliam quasi traderet, quâ medicamenta probatissima è simplicibus, in Tabulis enumeratis, solidè & rationabiliter præparari & in Praxi demum feliciter applicari possint ac debeant. *Figure aeneæ* per adscripta nomina seipsas explicabunt, exceptâ fortè majore in Tab. 1. ubi Partes Florum sistuntur in Flore Coronæ Imp. ita ut Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. designata *petala* alimentum capiant à *pedunculo* Num. 7. illudque instar viscerum perficiendo *fructui* nascenti Num. 8. sup. ineptis humoris partibus per *stamina* seu vasa excretoria Num. 9. 10. 11. 12. 13. 14. abeuntibus in *apices* seu receptacula Num. 15. 16. 17. 18. componuntur *pistillo* hîc extra florem eminenti. Tandem *stylus* nihil aliud est, quam basis & nodus inferior florem firmans & defendens quasi ab injuriis externis: neque aliud est, quam productio exterioris tunicæ in germine. His observatis plantarum characteres eorumque descriptiones, cuilibet Classi & Sectioni ab Autore præmissæ, facile poterunt intelligi. Ut verò in plantis spontè pullulantibus inquirendis & colligendis eò felicius progredi, earumque locum natalem & florendi tempus accuratius observare possint Botanophili, addimus pro coronide duplicem Tabulam, quarum altera è *Laurembergio* & *Simone Paulli* formata, altera autem à Celeberrimo quondam Medico, *Theophilo Kentmanno*, consignata, & Anno 1609. Gissæ Hassorum correctius & auctius edita est: quæ utraque cum utilitate, tum raritate LECTORI BENEVOLO se facile commendabit, quem cum omnigenæ prosperitatis appreciatione his optimè valere jubeo. *Dab. Gissæ Hassorum, die 20. April. A. 1715.*

MICHAEL BERNHARDUS VALENTINI,  
Archiatr & P. P. Gissens.

INSTI.







PARTES FLORUM  
*Simplicium.*

*Flos Campaniformis*



*Flos Campanif.  
tubulatus.*



*Flos Hypocrateriformis*



*Flos Infundibuliformis*



*Flos Rotatus*



*Flos Cruciformis*



*Flos Caryophyllæus*



*Flos Rosaceus*



FLORES APETALI Sive STAMINEI.

*Flos Avenæ*



*Flos Sparganii*



*Flos Equiset.*





*Flos Campaniformis .*  
*globosus*



*Flos Liliaceus .*



*Flos Belladonnae*  
*Campaniformis*  
*multifidus*



## FLORES COMPOSITI .

*Flos Radiatus*



*Flos flosculosus .*



*Flos semi flosculosus .*



## FLORES ANOMALI .

*Flores Polypetali anomali .*



*Fl. Papilionaceus .*



*Flos Personatus*



*Flores Monopetali anomali .*



*Flos Labiatus .*







# INSTITUTIONUM BOTANICARUM

## CLASSIS I.

### DE

## HERBIS FLORE MONOPETALO CAM- PANIFORMI.

### SECTIO

I.

Cujus Pistillum abit in fructum mollem & crassiusculum.

{ *Mandragora.*  
*Belladonna.*

2.

Pistillum abit in fructum mollem & oxiguum.

{ *Lilium convallium* { flore albo.  
*Polygonatum.* { flore rubro.  
*Ruscus.*

3.

Pistillum abit in fructum siccum, seu testam unicapfularem in nonnullis, in aliis in multicapfularem.

{ *Cerianthe.* { Major { cruciata.  
*Gentiana* { Minor { gentianella.  
*Hydrophyllon.*  
*Soldanella.*  
*Convolvulus.*  
*Tithymalus.*  
*Glaux.*

4.

Cujus Pistillum abit in unicum semen.

{ *Oxys,* seu Trifol. acetos.  
*Rhabarbarum* f. Rhaponticum.

5.

Pistillum abit in fructum ex vaginulis aut folliculis constantem.

{ *Cotyledon.*  
*Apocynum.*  
*Periploca.*  
*Asclepias.*

6.

è cujus fundo tubus exsurgit pistillum excipiens, quod in fructum multicapfularem abit.

{ *Malva* { vulgar.  
*Althea.* { crispa.  
*Alcea.* { rosea.  
*Malacoides.*  
*Abutylon* { *Alcea Vesicar.*  
*Ketmia* { *Abelmosch.*  
*Xylon.*

7.

Cujus calyx abit in fructum plerumque carnosum.

{ *Bryonia* { Vit. alb.  
*Tamnus.* { Momordica Ind. scand. f. foet.  
*Sicyoides.*  
*Momordica* { fativ.  
*Cucumis* { asininus sylvestris.  
*Pepo.*  
*Melopepo.*  
*Anguria.*  
*Cucurbita.*  
*Colocynthis.*

8.

Cujus calyx abit in fructum siccum.

{ *Campanula* { *Cervicaria.* { Hort.  
*Rapunculus.* { *Rapunc.* { Sylv.  
{ *Speculum Vengris.*

9.

Cujus calyx abit in fructum gemellum.

{ *Rubia.*  
*Apparine.*  
*Gallium.*  
*Cruciata.*

Herbæ Flore Monopetalo Campaniformi.



## CLASSIS II.

DE

## HERBIS FLORE MONOPETALO INFUNDIBULIFORMI ET ROTATO.

## SECTIO

1.

Gaudens Flore infundibuliformi, cu-  
jus Pistillum abit in fructum

*Quamoclit.*  
*Ményanthes* } Trifol. pal. majus.  
*Nicotiana.* } - - - fibrinum.  
*Hyoscyamus* } vulgar. } major.  
} albus } minor.  
*Stramonium.*  
*Pervinca.*  
*Auricula Urfi.*  
*Centaurium minus.*

2.

Cujus Flos Hypocrateriformis, quoad  
pistillum abit in fructum

*Androsace.*  
*Primula Veris.*  
*Plantago* } latifolia.  
} rosea.  
} angustifolia.  
*Coronopus.*  
*Psyllium.*

3.

Cujus Flos infundibuliformis, quoad  
calycem, abit in fructum

*Salapa, seu Solanum Mexican.*  
*Rubeola*  
*Trachelium* } Cervicaria Valerian.  
} Pyramidalis.  
*Valeriana.*  
*Valerianella.*

4.

Cujus Flos infundibulif. vel rotatus  
pistillum alit 4. veluti embryoni-  
bus stipatum, in totidem semina  
abscuntibus & in calice maturescen-  
tibus

*Borrago* } flore } cœruleo.  
} } candido.  
} Cynoglossum minus.  
*Buglossum* } Anchusa } major.  
} Echioides } minor.  
*Asperugo.*  
*Echium.*  
*Pulmonaria.*  
*Lithospermum.*  
*Symphytum* } majus } tuberos. rad.  
} minus }  
*Heliotropium.*  
*Cynoglossum.*  
*Omphalodes.*

5.

Flore infundibulif. &amp; sem. singular.

{ *Plumbago.*

6.

Fl. rotato, cujus pistillum abit in fru-  
ctum siccum

*Lysimachia* } Nummularia } major.  
} } minor.  
} Ephemerum Spur. Lob.  
*Samolus, seu Anagallis aquatica.*  
*Veronica* } Pseudo-Chamaedris.  
} Lysimachia Spicata.  
*Chrysosplenium.*  
*Polemonium, seu Valeriana Graca.*  
*Verbascum.*  
*Blattaria.*

7.

Fl. rotato, cujus pistillum abit in fru-  
ctum mollem

*Solanum.*  
*Lycopersicon, seu Poma amoris.*  
*Alkekengi.*  
*Melongena.*  
*Capficum.*  
*Nymphoides.*  
*Cyclamen.*  
*Moschatellina.*

8.

Cujus calyx abit in fructum

{ *Pimpinella* } Major.  
} Minor } lævis.  
} } hirsuta.  
} } inodora.

Herbæ Flore Mo-  
nopetalo infun-  
dibuliformi & ro-  
tato.



## DE

Herbæ Flore Mono-  
petalo, Ano-  
malo, in

*Arum* { non maculatum.  
 { maculat. mac. { candid.  
 { Dracunculus. { nigris.  
*Arisarum* { latifolium.  
 { triphyllum.

{	<i>Aristolochia</i>	{	rotunda.	{	vera.
			longa		Hisp.
{	<i>Rapuntium.</i>				pistol.

*Signonia.*  
*Digitalis* { *Purpur.*  
                  *Fl. candid.*  
                  *Minim. Gratiola dicta,*  
                  *Minor angustif.*  
*Pinguicula.*  
*Scrophularia.*

*Antirrhinum* { *Vulg. maj.*  
*Arvense.*  
*Linaria.*  
*Asarina.*  
*Pedicularis* { *Purpur. vulg.*  
*Lut. f. Crista Gall.*  
*Melampyrum.*  
*Euphrasia* { *Officin..*  
*Min.*  
*Polygala.*  
*Altharoda.*  
*Orobanche.*

{ *Acanthus* { Sativus feu Branca urf.  
                  { Sylvest.



## CLASSIS IV.

DE

## HERBIS ET SUFFRUTICIBUS FLORE MONOPETALO LABIATO.

## SECTIONE

1.

Habent labium superius galeatum vel falcatum.

*Phlomis.*  
*Horminum.*  
*Sclarea.*  
*Salvia* { *Latifolia.*  
           *Tenuifolia.*  
           *Fol. variegat. f. picta.*  
*Dracocephalon.*  
*Cassida.*  
*Brunella.*

2.

Habent labium superius cochlearis instar excavatum.

*Lamium* { *album vulg.*  
           *purpureum.*  
*Moldavica seu Melissa Turcica.*  
*Ballote.*  
*Galeopsis* { *Lamium maximum Sylv.*  
               *Urtica aculeata.*  
               *Sideritis arvensis.*  
*Stachys.*  
*Cardiaca.*  
*Leonurus.*  
*Molucca.*  
*Pseudodictamnus.*  
*Mentha*, quo pertinet { *Calamintha arv.*  
                                   *Pulegium.*  
*Marrubiastrum.*  
*Lycopus.*

Herbæ Flore Monopetalo Labiato, in

3.

Habent labium superius erectum.

*Syderitis.*  
*Marrubium.*  
*Melissa.*  
*Calamintha* { *Vulg. officin.*  
                   *Pulegium Sylv.*  
                   *Hedera terrestris.*  
*Clinopodium.*  
*Rosmarinus.*  
*Thymus*, quo pertinet { *Thymus vulg.*  
                               *Serpentar. Virgin.*  
*Serpillum.*  
*Satureja.*  
*Thymbra.*  
*Lavandula.*  
*Origanum*, quod l. { *Vulgar. & Sylv. vel*  
                               *Creticum seu Dictamnus Cret.*  
*Majorana.*  
*Verbena.*  
*Hyssopus.*  
*Stoechas.*  
*Cataria.*  
*Betonica.*  
*Ocymum.*

4.

Gaudent flore monopetalo unilabiato.

*Chamedris*, quod ref. { *Scordium.*  
                               *Salvia Sylv.*  
*Polium.*  
*Teucrium.*  
*Chamaepytis.*  
*Bugula.*



# CLASSIS V.

DE

## HERBIS FLORE POLYPETALO CRUCIFORMI.

Herbæ Flore Polypetalo Cruciformi gaudentes IX. habent Sectiones, quarum

1. Est, cujus pistillum abit in fructum unicapsularem non siliquosum
  - { *Thlaspi.*
  - { *Rapistrum.*
  - { *Myagrum.*
  - { *Isatis.*
  - { *Crambe*
2. Cujus pistillum abit in fructum satis brevem, bifariam divisum, septo intermedio, respectu valvarum, ad perpendiculum oblique positum.
  - { *Thlaspi*, quo
    - { *Bursa past. maj.*
    - { *Nasturtiol.*
    - { *Rosa de Jerich.*
  - { *Nasturtium.*
  - { *Thlaspidium.*
  - { *Cochlearia*
    - { *Lepid. glastif.*
    - { *Raph. Rustic.*
  - { *Lepidium.*
  - { *Bursa Past.*
3. Cujus pistillum abit in fructum septo intermedio valvis parallelo, bifariam divisum.
  - { *Alysson.*
  - { *Alyssoides.*
  - { *Lunaria.*
4. Cujus pistillum abit in fructum siliquosum, bicapsularem.
  - { *Brassica*
    - { *vulgaris.*
    - { *capitata.*
    - { *Sabauda.*
    - { *caulorapa*
    - { *asparagod.*
    - { *cauliflor.*
  - { *Leucojum.*
  - { *Hesperis.*
  - { *Turritis.*
  - { *Cardamine*
    - { *Nasturt. prat.*
    - { *Nast. aquat.*
  - { *Dentaria.*
  - { *Sisymbrium*
    - { *Raphan. aquat.*
    - { *Sophia Med.*
  - { *Eruca.*
  - { *Sinapi.*
  - { *Erysimum.*
  - { *Rapa.*
  - { *Napus.*
  - { *Raphanus.*
5. Cujus pistillum abit in siliquam articulofam.
  - { *Raphanistrum.*
  - { *Hypecoon.*
6. Cujus pistillum abit in siliquam unicapsularem.
  - { *Chelidonium.*
  - { *Sinapistrum.*
  - { *Epimedium.*
7. Cujus pistillum abit in fructum in ter-  
na aut quaterna loculamenta divi-  
sum.
  - { *Erucago.*
8. Cujus pistillum abit in plurima semi-  
na in capitulum collecta.
  - { *Paranogeton*
    - { *Tribulus aquat. minor.*
    - { *Millefol. aquat.*
9. Cujus pistillum abit in fructum mol-  
lem.
  - { *Herba Paris.*



# CLASSIS VI.

## DE HERBIS FLORE ROSACEO.

Herbæ Flore Ro-  
faceo IX. Genera  
habent, quorum

- |   |   |
|---|---|
| <p>I.</p> <p>Est, cujus pistillum abit in fructum unicapsularem, bifariam transverse hiescentem.</p>              | <p>{ <i>Amaranthus.</i><br/><i>Portulaca.</i></p>   |
| <p>2.</p> <p>Cujus pistillum aut calyx abeunt in fructum unicapsularem.</p>                                       | <p>{ <i>Papaver.</i><br/><i>Argemone.</i><br/><i>Anapodophyllum.</i><br/><i>Opuntia.</i><br/><i>Granadilla.</i><br/><i>Muricuja.</i><br/><i>Mitella.</i><br/><i>Alfina</i> quod pertinet { <i>Caryophyll. arvens.</i><br/><i>Alfinastrum.</i> { <i>Spergula.</i><br/><i>Myosotis.</i><br/><i>Ros Solis.</i><br/><i>Parnassia.</i><br/><i>Juncus.</i><br/><i>Kali.</i><br/><i>Telephium.</i><br/><i>Helianthemum.</i><br/><i>Androsamum.</i></p> |
| <p>3.</p> <p>Cujus pistillum abit in fructum plerumque bicapsularem.</p>  | <p>{ <i>Geum.</i><br/><i>Saxifragia.</i><br/><i>Salicaria.</i><br/><i>Glaucium</i> seu <i>Papav. Cornicul.</i></p>  |
| <p>4.</p> <p>Cujus pistillum abit in fructum multicapsularem.</p>   | <p>{ <i>Hypericum.</i><br/><i>Asterium.</i><br/><i>Pyrola.</i><br/><i>Damaconium.</i><br/><i>Ruta.</i><br/><i>Harmala.</i><br/><i>Nigella.</i><br/><i>Fabago.</i><br/><i>Corchorus.</i><br/><i>Cistus.</i><br/><i>Nymphaea.</i></p>   |
| <p>5.</p> <p>Cujus pistillum abit in fructum, in quo veluti nidulantur semina.</p>                                | <p>{ <i>Nelumbo.</i><br/><i>Capparis.</i></p>   |
| <p>6.</p> <p>Cujus pistillum abit in fructum ex plurimis veluti capsulis compositum.</p>                          | <p>{ <i>Sedum.</i><br/><i>Anacampseros.</i><br/><i>Ulmaria.</i><br/><i>Barba Capra.</i><br/><i>Egonia.</i><br/><i>Zuncago.</i><br/><i>Geranium.</i><br/><i>Talictum.</i><br/><i>Butomus.</i><br/><i>Helleborus</i>, sub quod <i>Aconit. min.</i><br/><i>Veratrum.</i><br/><i>Populago.</i><br/><i>Paonia.</i><br/><i>Tribulus.</i></p>  |
| <p>7.</p> <p>Cujus pistillum abit in fructum ex plurimis seminibus in capitulum quoddam collectis compositum.</p> | <p>{ <i>Anemone.</i><br/><i>Pulsatilla.</i><br/><i>Ranunculus.</i><br/><i>Filipendula.</i><br/><i>Clematis.</i><br/><i>Caryophyllata.</i><br/><i>Fragaria.</i><br/><i>Pentaphyll.</i><br/><i>Tormentill.</i><br/><i>Pentaphyllodes.</i></p>   |
| <p>8.</p> <p>Cujus pistillum vel calyx abit in fructum mollem.</p>  | <p>{ <i>Christophoriana.</i><br/><i>Phytolacca.</i><br/><i>Aralia.</i><br/><i>Asparagus.</i></p>  |
| <p>9.</p> <p>Cujus calyx abit in fructum siccum.</p>  | <p>{ <i>Cuminoides.</i><br/><i>Circaea.</i><br/><i>Agrimonia.</i><br/><i>Agrimonoides.</i><br/><i>Onagra.</i><br/><i>Chamaenerion.</i></p>  |



# CLASSIS VII.

DE

## HERBIS FLORE POLYPETALO ROSACEO UMBELLATO.

Herbæ Flore Monopetalo Rosaceo umbellato

<p>1. Circinatò disposito, cujus calyx abit in duo semina exigua &amp; striata.</p>	<p><i>Ammi.</i>  <i>Apium</i> { <i>Petroselin.</i> { <i>Vulg.</i>                    <i>Anisum.</i> { <i>Maced.</i>  <i>Cicuta.</i>  <i>Carvi.</i>  <i>Phellandrium.</i>  <i>Bulbocastanum.</i>  <i>Daucus</i> { <i>fativus</i> f. <i>Pastinaca tenuis.</i>                    <i>sylvestris</i>  <i>Sium.</i>  <i>Sisarum.</i>  <i>Tragoselinum.</i>  <i>Bupleurum.</i></p>
<p>2. Circinatò disposito, cujus calyx in 2. semina angusta, oblonga &amp; satis crassa abit.</p>	<p><i>Foeniculum</i> { <i>Cumin. fativ.</i>                    <i>Seseli Massil.</i>  <i>Meum.</i>  <i>Oenanthe.</i>  <i>Angelica.</i>  <i>Astrantia.</i>  <i>Cherophyllum.</i>  <i>Myrrhis.</i></p>
<p>3. Circinatò disposito, cujus calyx in 2. semina subrotunda &amp; crassiora abit.</p>	<p><i>Smyrnium.</i>  <i>Coriandrum.</i></p>
<p>4. Circinatò disposito, cujus calyx abit in 2. semina plana, ovata, satis ampla.</p>	<p><i>Imperatoria.</i>  <i>Crithmum.</i>  <i>Anethum.</i>  <i>Pucedanum.</i></p>
<p>5. Circinatò disposito, cujus calyx abit in 2. semina ovata, plana, ampla.</p>	<p><i>Oreoselinum.</i>  <i>Thyselinum.</i>  <i>Pastinaca Latifolia</i> { <i>Sativ.</i>                                    <i>Sylv.</i>  <i>Sphondylium.</i>  <i>Tordylium</i> { <i>maj.</i>                    <i>min. f. seseli Cret.</i>  <i>Ferula.</i>  <i>Thapsia.</i></p>
<p>6. Circinatò disposito, cujus calyx abit in 2. semina ampla &amp; profundis striis excavata.</p>	<p><i>Cicutaria.</i>  <i>Caucalis.</i>  <i>Ligusticum.</i>  <i>Laserpitium.</i></p>
<p>7. Circinatò disposito, cujus calyx abit in 2. semina cortice fungoso obducta.</p>	<p><i>Cachrys.</i></p>
<p>8. Circinatò disposito, cujus calyx abit in 2. semina in caudam longam deficientia.</p>	<p><i>Scandix.</i></p>
<p>9. Flore umbellato, in capitulum conglobato.</p>	<p><i>Sanicula.</i>  <i>Eryngium.</i>  <i>Hydrocotyle.</i></p>



# CLASSIS VIII.

## DE

### HERBIS FLORE POLYPETALO CARYOPHYLLÆO.

---

Herbæ Flore Polypetalo Caryophyllæo, cujus

I.  
Pistillum abit in fructum.

- Caryophyllus* {
  - simplex {
    - hortensis.
    - sylvestr. {
      - maj.
      - muralis.
  - plenus {
    - maximus.
    - Carthusianorum.
- Lychnis* {
  - coronaria.
  - viscosa.
  - sylvestris {
    - Saponaria.
    - Flos cuculi.
- Cucubalus* vel *Alfina* baccifera.
  - fativum, vulg. cœruleum.
  - perenne {
    - majus.
    - minus.
- Linum* {
  - arvense.
  - sylvestre.
  - maritimum.
  - pratense.
  - Lusitanicum.
  - Alpinum.

2.  
Pistillum abit in semen calyce ipso involutum.

- Statice* {
  - Caryophyll. mont.* {
    - major.
    - minor.
    - minimus.
  - Caryophyllus Alpinus.*
  - Lusitanica* {
    - Scorzon. fol.
    - fruticosa.
    - capillar. fol.
- Limonium* {
  - Maritimum* {
    - Majus.
    - Minus.
    - Minimum.
  - Fruticosum.
  - Reticulatum.
  - Siculum.
  - Lusitanicum.
  - Hispanicum.
  - Valentinum.



# CLASSIS IX.

## DE

### HERBIS FLORE LILIACEO.

1.  
Monopetalo, in sex partes secto, cujus  
pistillum abit in fructum.

*Asphodelus.*  
*Lilio - Asphodelus.*  
*Hyacinthus.*  
*Muscari*, quo ref. *Hyacinth.* { *Racemosus.*  
*Colchicum.* { *Comosus.*

2.  
Monopetalo, in sex partes secto, cujus  
calyx abit in fructum.

*Crocus* { *autumnalis*  
          { *vernus.*  
*Narcissus.*  
*Iris*, quæ vel { *hortensis.* { *pratensis.*  
                  { *sylv.* { *palustris.*  
*Xiphion.*  
*Sisyrinchium.*  
*Gladiolus.*  
*Aloë.*  
*Cannacorus* { *Canna Indica.*  
                  { *Curcuma.*

Herbæ Flore Li-  
liaceo

3.  
Tripetalo.

{ *Ephemerum*, f. *Phalangium Virginianum.*

4.  
Hexapetalo, cujus pistillum abit in  
fructum.

{ *Phalangium.*  
*Liliastrum.*  
*Lilium.*  
*Lilio - Hyacinthus*, f. *Hyac. stellatus fol.*  
*Corona Imperialis.* (& rad. lil.  
*Tulipa.*  
*Fritillaria.*  
*Dens Canis.*  
*Ornithogalum.*  
*Porrum.* { *fativa* { *vulgaris.*  
*Cepa*, quò pertinet { *fossilis.*  
*Allium.* { *juncifol. f. allium sylv.*

5.  
Ex petalis sex composito, cujus calyx  
abit in fructum.

{ *Lilio - Narcissus.*  
*Narcisso - Leucojum.*  
*Bermudiana*, quæ vel { *iridis* } fol.  
                                  { *palmæ* }



CLASSIS X.  
DE  
HERBIS FLORE POLYPETALO; PAPI-  
LIONACEO.

Herbæ Flore Poly-  
petalo, Papilio-  
naceo, cuius

- |  |   |
|--|---|
| <p>I.<br/>Pistillum abit in filiquam unicapsula-<br/>rem &amp; brevem.</p> | <p><i>Glycyrrhiza.</i><br/><i>Cicer.</i><br/><i>Lens.</i><br/><i>Onobrychis.</i><br/><i>Vulneraria.</i><br/><i>Dorycnium.</i></p>   |
| <p>2.<br/>Pistillum abit in filiquam unicapsula-<br/>rem longam.</p>       | <p><i>Faba</i>, quæ vel { <i>major.</i><br/>                          <i>minor.</i><br/>                          <i>minima.</i></p> <p><i>Lupinus.</i><br/><i>Orobus.</i></p> <p><i>Pisum</i> { <i>majus quadratum.</i><br/>          <i>minus</i> { <i>hortense.</i><br/>                      <i>arvense fruct.</i> { <i>albo.</i><br/>  <i>cœrul.</i><br/>  <i>virid.</i></p> <p><i>Lathyrus.</i><br/><i>Clymenum.</i><br/><i>Ochrus.</i><br/><i>Vicia.</i><br/><i>Ervum.</i><br/><i>Galega</i>, quæ vel { <i>Vulgaris.</i><br/>                          <i>Africana.</i><br/><i>Astragaloides.</i> { <i>Americana.</i><br/><i>Aphaca.</i></p> |
| <p>3.<br/>Pistillum abit in filiquam articulofam.</p>                      | <p><i>Securidaca.</i><br/><i>Ornithopodium.</i><br/><i>Ferrum equinum.</i><br/><i>Hedysarum.</i><br/><i>Scorpioides</i>, filiquis vel { <i>lenibus.</i><br/>  <i>asperis.</i></p>   |
| <p>4.<br/>Foliis ternis.</p>   | <p><i>Lotus.</i><br/><i>Trifolium.</i><br/><i>Melilotus</i>, quò ref. <i>Trifolium prat. luteum.</i><br/><i>Anonis.</i><br/><i>Fœnumgracum.</i><br/><i>Medica.</i><br/><i>Medicago.</i> { <i>Vulgaris.</i><br/>                      <i>Americanus.</i><br/><i>Phaseolus</i> { <i>Brasilianus.</i><br/>                      <i>Ægyptiacus.</i></p>   |
| <p>5.<br/>Pistillum abit in filiquam bicapsula-<br/>rem.</p>               | <p><i>Astragalus.</i><br/><i>Tragacantha.</i><br/><i>Pelecinus.</i></p>   |



# CLASSIS XI.

DE

## HERBIS FLORE POLYPETALO ANOMALO

Herbæ Flore Polypetalo Anomalo, cujus

1. Pistillum abit in fructum unicapsum.

- Balsamina* { *Fœmina.*  
*Indica.*  
*Noli me tangere.*
- Viola* { *Martia.*  
*Flos Trinitatis.*
- Fumaria*, quò ref. { *Fum. Officin.*  
*Radix cava.*
- Capnoides.*
- Reseda.*
- Luteola* { *Salicis folio.*  
*Lusitanica.*  
*Pyrenaica.*

2. Pistillum abit in fructum multicapsularem.

- Sesamoides.*
- Aconitum*, sub quo { *Napellus.*  
*Antithora.*
- Delphinium*, ad quod pertinet. { *Consol. Reg.*  
*Staphisagr.*
- Aquilegia.*
- Fraxinella.*
- Cardaminum*, f. *Nast. Indicum.*
- Melianthus.*
- Corindum.*

3. Calyx abit in fructum.

- Orchis* { *Cynosorchis.*  
*Palma Christi.*
- Helleborina.*
- Calceolus.*
- Limodorum.*
- Ophris* { *bifolia.*  
*- - bulbos.*  
*trifolia.*  
*palustris.*  
*minima.*
- Nidus avis*, f. *Orobanche.*



# CLASSIS XII.

## DE

### HERBIS FLORE FLOSCULOSO.

Herbæ Flore Flo-  
sculoso

1. Sterili.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Xanthium</i> { Diofc. f. Lappa minor. Canadense. Lusitanicum.</li> <li><i>Ambrosia.</i></li> <li><i>Gnaphalodes.</i></li> </ul>
2. Semine pappis instructo.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Carduus</i>, quò ref. { <i>Jacea lutea.</i> <i>Card. Mariæ.</i></li> <li><i>Cynara.</i></li> <li><i>Jacea.</i></li> <li><i>Cyanus.</i></li> <li><i>Cirsium.</i></li> <li><i>Centaurium majus.</i></li> <li><i>Lappa</i>, cujus species <i>Lappa</i> { <i>Major.</i> <i>Maxima.</i> <i>Montan.</i></li> <li><i>Cnicus.</i></li> <li><i>Petasites</i> { <i>Major f. vulgaris.</i> <i>Minor.</i></li> <li><i>Cacalia.</i></li> <li><i>Elychrysium.</i></li> <li><i>Filago.</i></li> <li><i>Conyza.</i></li> <li><i>Eupatorium.</i></li> <li><i>Senecio</i> { <i>Vulgaris.</i> <i>Americanus.</i></li> </ul>
3. Semine pappis nequaquam instructo.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Carthamus.</i></li> <li><i>Absinthium</i> { <i>Vulgare.</i> <i>Ponticum.</i></li> <li><i>Abrotanum.</i></li> <li><i>Artemisia.</i></li> <li><i>Santolina.</i></li> <li><i>Gnaphalium.</i></li> <li><i>Tanacetum</i> { <i>vulg. luteum.</i> <i>crispum.</i> <i>hortenf. seu mentha corymbi-</i></li> </ul>
4. Flosculis in lacinias æquales divisis & calyci proprio insidentibus.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Echinops.</i></li> </ul>
5. Flosculis in lacinias inæquales ut plurimum divisis & calyci proprio insidentibus.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Scabiosa.</i></li> <li><i>Dipsacus</i> { <i>fativus.</i> <i>sylvester.</i> <i>folio laciniato.</i> <i>Giganteus.</i> <i>Indicus.</i></li> <li><i>Globularia.</i></li> </ul>



# CLASSIS XIII.

DE

## HERBIS FLORE SEMI-FLOSCULOSO.

Herbæ Flore Sc-  
mi-Flosculofo

1.  
Semine Pappis instructo.

*Dens Leonis.*  
*Hieracium*, quò { *Pulmonaria Gallic.*  
                                  { *Auric. muris Hispan.*  
*Lactuca* { *vulg.*  
                  { *intybacea.*  
                  { *crispa.*  
                  { *sylvestr.*  
*Sonchus.*  
*Chondrilla.*  
*Zacintha*, f. *Chondrilla Verrucaria.*  
*Scorzonera.*  
*Tragopogon* { *pratense* { *majus.*  
                                  { *minus.*  
                                  { *porri folio.*  
                                  { *hirsutum.*

2.  
Semine nullis Pappis instructo.

*Catanance flore* { *plen. cærul.*  
                                  { *lut.* { *latifol.*  
  { *angustif.*  
*Hedypnois.*  
*Cichorium* { *fativum* { *latifol.*  
                                  { *sylvest.* { *angustifol.*  
  { *officin.*  
*Lampsana.*  
*Rhagadiolus.*  
*Scolymus* { *Chrysanthemus annuus.*  
                  { *Chrysanth. African.*



# CLASSIS XIV.

## DE

### HERBIS FLORE RADIATO.

Herbæ Flore Ra-  
diato

- |   |  |
|---|--|
| <p>1.<br/>Semine Pappis instructo.</p>                              | <p><i>Aster</i> { Atticus { vulgaris.<br/>                  { arvensis. { Alpinus.<br/><i>Virga aurea.</i><br/><i>Jacobaea</i> { vulg.<br/>                  { Alpina.<br/>                  { Hispanica.<br/><i>Tussilago.</i><br/><i>Doronicum.</i></p>  |
| <p>2.<br/>Seminibus capitulo foliato instructis.</p>                | <p><i>Tagetes</i> seu Flos Africanus { Major.<br/><i>Corona Solis.</i> { Minor.</p>  |
| <p>3.<br/>Semine Pappis &amp; Capitulis foliosis ca-<br/>rente.</p> | <p><i>Bellis</i> { hortens. { rubra.<br/>                  { sylv. { varieg.<br/>                                  { alba.<br/>                                  { prolifera.<br/><i>Chrysanthemum.</i><br/><i>Leucanthemum</i> { Bellis major.<br/>                                  { montan.<br/><i>Matricaria.</i><br/><i>Chamomelum</i> { Vulgare.<br/>                                  { Romanum.<br/><i>Cotula.</i><br/><i>Bupthalmum.</i><br/><i>Millefolium.</i><br/><i>Ptarmica</i> { Vulgar. Pratens.<br/>                  { Alpina.<br/><i>Asteriscus.</i></p> |
| <p>4.<br/>Seminibus in capsulâ reconditis.</p>                      | <p><i>Caltha</i> { vulgaris.<br/>                  { Polyanthos.</p>   |
| <p>5.<br/>Cujus discus ex petalis planis compo-<br/>nitur.</p>      | <p><i>Xeranthemum.</i><br/><i>Carlina</i> { Acaulos.<br/>                  { Caulescens.<br/>                  { Sylvestris.</p>   |



# CLASSIS XV.

DE

## HERBIS FLORE APETALO f. STAMINEO.

1.	Cujus calycis posterior pars abit in fructum.	<i>Asarum</i> { Dodon. Americanum. Virginianum. <i>Beta</i> { alba. { rubra { major. { minor.
2.	Cujus pistillum abit in semen calyce obvolutum.	<i>Acetosa.</i> <i>Lapathum.</i> <i>Attriplex</i> , quæ vel { hortensis { alba. { sylvestris. { rubra. <i>Chenopodium</i> , ad quod pert. { Botrys. { Bonus Henr. <i>Blitum.</i> <i>Herniaria.</i> { Narbonensis. { Supina. <i>Paronychia</i> { Hispanica { fruticos. <i>Alchimilla.</i> { Lusitanica. <i>Parietaria.</i> <i>Persicaria</i> { mitis { maculosa. { urens f. Hydropiper. { non maculosa. <i>Polygonum.</i> <i>Eragrostis.</i> <i>Bistorta</i> { Vulg. major & med. { Alpina { maxima. { media. { minor.
3.	Apetalo, quæ Cereales appellantur, earumque affines.	<i>Triticum.</i> <i>Secale</i> { vernum, vel minus C. B. { hybernum, vel majus C. B. <i>Hordeum.</i> <i>Oryza.</i> <i>Avena</i> { alba, seu vulgaris. { nigra tenuior. <i>Milium.</i> { Loliaceum. <i>Panicum.</i> { Spicatum. <i>Gramen.</i> { Dactylon. <i>Arundo.</i> { Paniculatum. { Avenaceum.
4.	Apetalo in capitulum squamosum collecto.	<i>Cyperus</i> { Rotundus, vulg. C. B. { Americanus. <i>Scirpus.</i> { Orientalis.
5.	Apetalo in eadem planta à floribus se- juncto.	<i>Cyperoides.</i> { major. <i>Typha palustris</i> { media. <i>Sparganium.</i> { minor. <i>Mays.</i> <i>Lacryma Jobi.</i> { Vulgaris. <i>Ricinus</i> , qui vel { American. { African. { Zeylanicus.
6.	Apetal. quarum alia in eodem genere floribus, alia verò fructibus plerun- que donantur.	<i>Equisetum.</i> <i>Spinacia.</i> <i>Mercurialis</i> { testiculata f. mas. { spicata f. foemin. <i>Urtica.</i> <i>Cannabis.</i> <i>Lupulus</i> { Mas. { foemin.



## CLASSIS XVI.

DE

HERBIS QUÆ FLORIBUS CARENT, ET  
SEMINE DONANTUR.

1.

Quarum fructus foliis innascuntur.

Herbæ, quæ Flo-  
ribus carent, & se-  
mine donantur.

- |                                       |                   |   |                                     |
|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| {                                     | <i>Filix</i>      | { | Arborefcens.                        |
|                                       |                   |   | Ramofa.                             |
| {                                     |                   | { | Non ramofa.                         |
|                                       |                   |   |                                     |
| {                                     | <i>Lonchitis</i>  | { | aspera { major.                     |
|                                       |                   |   | glabra. { minor, feu adianth. nigr. |
| <i>Trichomanes.</i>                   |                   |   |                                     |
| {                                     | <i>Polypodium</i> | { | vulgare.                            |
|                                       |                   |   | minus.                              |
|                                       |                   |   | majus fol. { acuto.                 |
|                                       |                   |   | { ferrato.                          |
| <i>Ruta muraria.</i>                  |                   |   |                                     |
| {                                     | <i>Filicula</i>   | { | fontana { major f. adianth. alb.    |
|                                       |                   |   | montana. { minor.                   |
| <i>Adiantum</i> feu Capillus Veneris. |                   |   |                                     |
| {                                     | <i>Asplenium</i>  | { | Offic. Ceterach.                    |
|                                       |                   |   | ramofum.                            |
|                                       |                   |   | villofum.                           |
|                                       |                   |   | crifpum.                            |
| <i>Lingua Cervina.</i>                |                   |   |                                     |
| {                                     | <i>Hemionitis</i> | { | vulgaris.                           |
|                                       |                   |   | peregrina Cluf.                     |
|                                       |                   |   | Lufitan.                            |
|                                       |                   |   | maxima { trifol.                    |
|                                       |                   |   | { quinquefol.                       |
|                                       |                   |   | varia.                              |

2.

Quarum femina foliis non innascun-  
tur.

- |   |                     |   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| { | <i>Osmunda</i>      | { | Filix florida.    |
|   |                     |   | Lunaria racemofa. |
|   |                     |   | Lonchit. hirsuta. |
|   |                     |   | Adiantum Saxofum. |
| { | <i>Ophioglossum</i> | { | vulgare.          |
|   |                     |   | fol. angulofo.    |
|   |                     |   | minus. { majus.   |
|   |                     |   | bilingue { med.   |
|   |                     |   | palmatū. { minus. |
|   |                     |   | cordiforme.       |
| { | <i>Lichen</i>       | { | arboreus.         |
|   |                     |   | saxatilis         |
|   |                     |   | pyxidatus { maj.  |
|   |                     |   | { min.            |



# CLASSIS XVII.

DE

## HERBIS QUARUM FLORES ET FRUCTUS vulgò DESIDERANTUR.

Herbæ, quarum  
Flores & Fructus  
vulgò desideran-  
tur, sunt

1.  
Herbæ terrestres floribus & fructibus  
vulgò destitutæ

*Muscus* { capillaceus.  
squamosus.  
pennatus.  
*Fungus.*  
*Fungoides*, quo pertinent { Fungi Seminiferi  
Pezicæ.  
*Boletus.*  
*Agaricus* { Officin. è Larice.  
Pedis equini facie.  
Auricul. formâ s. Aur. Jud.  
*Lycoperdon* { maximum, Chir. Bovista.  
medium.  
pulverulentum.  
*Coralloides.*  
*Tubera.* { Matth.  
Testiculorum form.

2.  
Herbæ Marinae aut fluviatiles floribus  
& fructibus vulgò carentes.

*Fucus.*  
*Alga* { angustifolia Vitriariorum.  
graminea { minor.  
seminifera.  
fluviatilis.  
capillacea.  
*Acetabulum.*  
*Corallina* { fistulosa.  
geniculata.  
muscosa &c.  
*Corallium* { album.  
flavum.  
rubrum { intens.  
ros. col.  
*Madrepora.*  
*Lithophyton* { Corallium nigrum s. antip.  
frutic. marin.  
*Tubularia.*  
compressa { magna  
exig. form.  
*Spongia* { globosa.  
ramosa.  
villosa.  
Americana.  
*Eschara.*  
durum.  
molle.  
*Alcyonium* { stuposum.  
tuberosum.  
vermiculatum.



## CLASSIS XVIII.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE  
APE TALO.Arbores & Fru-  
tices Flore Ape-  
talo1.  
Cum fructu conjuncto.

{	<i>Fraxinus</i>	{	Excelsior.
			humilior.
{	<i>Siliqua</i>	{	rotundiore fol.
			florifera.
{	<i>Siliqua</i>	{	non edulis.
			edulis
{		{	communis.
			fructu breviori.
{		{	fruct. vario.

2.  
In eadem plantâ à fructu separato.

{	<i>Buxus</i>	{	maxim. arborese.
			major.
{	<i>Empetrum</i>	{	minor.
			fol. { longior.
{		{	rotund.
			Montanum.
{		{	Lusitanicum.

3.  
Quorum alii in eodem genere flori-  
bus, alii verò fructibus plerumque  
donantur.

{	<i>Terebinthus</i>	{	Vulgaris.
			Peregrin. fruct. { maj.
{		{	min.
			Indica.
{	<i>Lentiscus</i>	{	Pistacia Trifol.
			Cappadocica.
{		{	Americana.
			Vulgaris.
{		{	Angustifol.



# CLASSIS XIX.

DE

## ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE AMENTACEO.

Arbores & Fruti-  
ces Flore Amen-  
taceo

1.	In eadem arbore à fructu osseo sepa- rato.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nux</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>Vulgaris seu Regia.</li> <li>caballina fr. max.</li> <li>fragilis.</li> <li>bifera &amp;c.</li> <li>fructu perdurô.</li> </ul> </li> <li><i>Corylus.</i></li> <li><i>Carpinus.</i></li> </ul>
2.	In eadem arbore plerumque separato à fructu, cujus involucrum coria- ceum est.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Quercus</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>Vulg. pedic. { brevi.</li> <li>                  { longo.</li> <li>Burgundica.</li> <li>parva { Phagus Græcor.</li> <li>          { Pumila Clus.</li> <li><i>Ilex.</i> { Fol. muricatus, ut robur.</li> <li><i>Suber.</i></li> <li><i>Fagus.</i></li> <li><i>Castanea</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>fativa, major.</li> <li>sylvestris.</li> <li>humilis.</li> <li>Americana.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
3.	In eadem arbore separato à fructu squamoso.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Abies.</i></li> <li><i>Pinus.</i></li> <li><i>Laryx.</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>Conifera fol. decid.</li> <li>Oriental. f. Cedrus Liban.</li> <li>Americana.</li> </ul> </li> <li><i>Thuja.</i></li> <li><i>Cupressus</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>Plinii { <ul style="list-style-type: none"> <li>Maf.</li> <li>Fœmina.</li> </ul> </li> <li>Lusitanica.</li> </ul> </li> <li><i>Alnus.</i></li> <li><i>Betula.</i></li> </ul>
4.	In eadem arbore separato à fructu molli.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Cedrus</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>folio cupress. { maj.</li> <li>                      { med.</li> <li>Hispanica.</li> </ul> </li> <li><i>Juniperus.</i></li> <li><i>Taxus.</i></li> <li><i>Morus fruct.</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>nigro.</li> <li>albo.</li> </ul> </li> </ul>
5.	In eadem arbore separato à fructu sicco.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Platanus</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientalis.</li> <li>Occidentalis.</li> </ul> </li> </ul>
6.	Quorum alii in eodem genere florum tantum, alii verò fructibus solis plerumque donantur.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Salix.</i></li> <li><i>Populus</i> { <ul style="list-style-type: none"> <li>alba { <ul style="list-style-type: none"> <li>maj. fol.</li> <li>min. fol.</li> </ul> </li> <li>nigra.</li> <li>tremula.</li> </ul> </li> </ul>



## CLASSIS XX.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE  
MONOPETALO.Arbores & Fruti-  
ces Flore Mono-  
petalo, cujus

Arbores & Fruti- ces Flore Mono- petalo, cujus	1.	Pistillum abit in fructum mollem fe- minibus callosis foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Rhamnus</i> { Catharticus.</li> <li>                  { Hispanicus.</li> <li><i>Thymelaea.</i></li> <li><i>Alaternus.</i></li> <li><i>Phyllyrea.</i></li> <li><i>Ligustrum</i> { Germanicum.</li> <li>                  { Variegatum.</li> <li>                  { Americanum.</li> <li><i>Laurus.</i></li> <li><i>Jasminum.</i></li> <li><i>Arbutus</i> { folio ferrato.</li> <li>              { fructu turbinato.</li> </ul>
	2.	Pistillum abit in fructum feminibus osseis foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Olea.</i></li> <li><i>Styrax.</i></li> <li><i>Uva Ursi.</i></li> <li><i>Aquifolium.</i></li> <li><i>Guajacana</i> { angustifolia.</li> <li>                  { latifolia.</li> </ul>
	3.	Pistillum abit in fructum membrana- ceum.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ulmus</i> { campestris.</li> <li>          { folio { scabro { latifol.</li> <li>                  { glabro. { angust.</li> </ul>
	4.	Pistillum abit in fructum multicapsu- larem.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Lilac.</i> { Ligust. fol. caerulea.</li> <li>          { Syringa fl. caerulea.</li> <li>          { fol. laciniat.</li> <li><i>Erica.</i></li> <li><i>Vitex</i> f. Agnus castus { latifol.</li> <li>                              { angust.</li> <li><i>Chamaerhodendron.</i></li> </ul>
	5.	Pistillum abit in fructum filiquosum.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nerion</i> { flor. { rubesc.</li> <li>          {       { albis.</li> <li>          { Indic.</li> <li>          { American.</li> <li><i>Acacia.</i></li> <li><i>Mimosa.</i></li> </ul>
	6.	Calyx abit in baccam.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sambucus</i> { vulgar.</li> <li>              { racemosa rubra.</li> <li>              { herbacea f. Ebulus.</li> <li><i>Opulus</i> f. samb. { aquat.</li> <li>                      { rosea.</li> <li><i>Viburnum.</i></li> <li><i>Tinus.</i></li> <li><i>Vitis idaea</i> f. myrtilli { nigr.</li> <li>                              { rubr.</li> <li><i>Caprifolium.</i></li> <li><i>Periclymenon.</i></li> <li><i>Chamaecerasus.</i></li> <li><i>Xylosteon.</i></li> </ul>
	7.	Flore monopetalo à fructu separato.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Viscum</i> baccis { alb.</li> <li>                      { rubr.</li> </ul>



# CLASSIS XXI.

DE

## ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE ROSACEO.

Arbores & Frutices Flore Rosaceo, cujus

1.	Pistillum abit in fructum unicapsularem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cotinus.</li> <li>Toxicodendron.</li> <li>Rhus.</li> <li>Tilia folio { maj. f. til. vulgar. min. molliter hirsut.</li> <li>Hippocastanum.</li> </ul>
2.	Pistillum abit in baccam, vel singularem, vel multiplicem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celtis.</li> <li>Frangula.</li> <li>Hedera { Communis. Poëtica. Americana.</li> <li>Vitis.</li> <li>Berberis.</li> <li>Rubus { vulg. idæus fr. { alb. rubr.</li> </ul>
3.	Pistillum abit in fructum multicapsularem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acer.</li> <li>Staphylodendron { vulgar. trifolium.</li> <li>Paliurus.</li> <li>Azederach.</li> <li>Enonymus.</li> <li>Syringa alba { flor. simpl. flor. plen.</li> </ul>
4.	Pistillum abit in fructum ex siliculis in capitulum congestis compositum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spiraea.</li> </ul>
5.	Pistillum abit in siliquam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Senna { Alexandrina acut. fol. Florentina obtus. Americana.</li> <li>Poinciana.</li> <li>Cassia.</li> </ul>
6.	Pistillum abit in fructum carnosum, seminibus callosis foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aurantium { vulg. { dulc. } med. sylvestr. { acr. }</li> <li>Citream.</li> <li>Limon.</li> <li>Sinense. { simpl. multipl. }</li> </ul>
7.	Pistillum abit in fructum ossiculo foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prunus.</li> <li>Armeniaca fructu { majori. medio. minori.</li> <li>Persica.</li> <li>Cerasus.</li> <li>Amygdalus { sativ. { dulc. } dur. { amar. } frag.</li> <li>Indica varia.</li> <li>Zizyphus.</li> <li>Lauro-Cerasus.</li> </ul>
8.	Calyx abit in fructum seminibus callosis foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pyrus.</li> <li>Cydonia fructu { oblong. rotund.</li> <li>Cratægus.</li> <li>Sorbus.</li> <li>Malus.</li> <li>Punica flor. { simpl. pleno f. Balauft.</li> <li>Rosa.</li> <li>Grossularia.</li> <li>Myrtus.</li> </ul>
9.	Calyx abit in fructum ossiculis foetum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cornus { hortensis. sylvestr.</li> <li>Mespilus.</li> </ul>



CLASSIS XXII.

DE

ARBORIBUS ET FRUTICIBUS FLORE  
PAPILIONACEO.

I.

Foliis singularibus, alternô aut verti-  
cillato ordine dispositis, ut

*Asiatica* { folio verruc.  
 fol. cordiform.  
*Crotalar.* { *Africana.*  
*Americana.*  
*Indiæ Orient.*  
*Genista.*  
*Spartium.*  
*Genista - Spartium.*  
*Erinacea* { *Cretica.*  
*Hispanica.*  
*Genistella.*  
*Siliquastrum* { *Judaic. arb.*  
*flore albo.*  
*amplioribus filiq.*  
*Canadense.*

2.

Flore leguminoso, folio terno singulis  
pedunculis innatescente, ut

*Anagyris foetid.* { Vera.  
                                  { Cretica.  
*Cytisus.*  
*Cyriso-Genista* { flore alb.  
                                  { flor. lut.  
                                  { Lusitanica.

3.

Foliis per conjugationes costæ plerumque innascentibus.

*Pseudo-Acacia* { *Vulgaris Spin.*  
                          *American.*  
*Colutea.*  
*Emerus* { *major.*  
              *humilior.*  
*Coronilla.*  
*Barba Jovis* { *pulchre lucens.*  
                      *pumila villos.*  
                      *Lagopoides.*  
                      *Hispanica.*  
                      *Lusitanica.*  
                      *Ind. Orient.*

Arbores & Fru-  
tices Flore Papi-  
lionaceo gaudent  
vel



D. PAULI HERMANNI

# CHARACTERISMI MATERIÆ MEDICÆ.


## CLASSIS I. DE PARTIBUS ANIMALIUM.

Animalium partes sunt vel	{	Salinæ	{	cum multis terreis particulis.	{	Cornu Cervi.
						Cranium humanum.
						Ebur.
						Unicornu.
						Ungula Alcis.
						Blatta Byzantina.
						Oculi 69.
						Mandibula Luc. piscis.
						Dentes Apri.
						Os Sepia.
	{		{	cum odore fragranti.	{	Sanguis Hirci.
						Mumia.
						Margarit.
						Bezoar { Orientale.
						{ Occident.
						Entali.
						Dentali.
						Umbilicus Veneris.
						Moschus.
						Zibethum
	{		{	Blandiores.	{	Castoreum
						Sperma Ceti
						} cum ping.
						Scinicus.
						Lumbrici.
						Sanguisuga.
						Cantharides.
	{	Oleosæ Crassæ	{	Acerrimæ Causticæ	{	Ichthyocolla.
						Adipes cum pauc. vol.
	{	Terreæ,	{	ut Serici follic. c. pauc. vol.	{	



# CLASSIS II. DE RADICIBUS.

Radices  
sunt vel





# CLASSIS III. DE HERBIS.

Herbæ sunt vel	1. Aquosæ crassæ, seu Mucilaginosæ	{ Althea. Malva. Tussilago. Verbascum.	{ cum acredine intensiss. cum acredine minori cum paucis fixis cum multis fixis cum resina vol.	{ Rosmarinus. Salvia. Mentha {aquatica, {crispa, Menthastrum. Nepeta. Calamintha. Pulegium. Eupatorium. Hyssopus. Polium. Dictamnus Creticus. Matricaria. Artemisia. Schœnanthum. Abrotanum. Marrubium. Ruta. Sabina. Tanacetum {Pontic. {Roman. Absinthium. Chamæpithis. Botrys. Folia Lauri.
2. Salinæ, quæ vel	{ Cauda Equina. Muscus. Pulmonaria. Solidag. Virga aurea. Bursa Pastoris. Verbena. Fol. quercus. Pyrola. Sanicula. Alchymilla. Pilosella. Polygonum. Adiantum. Capill. ♀. Polytrichon. Ceterach. Psyllitis.	{ Blandæ	{ cum vol. pauc. cum terr. & pauciss. vol.	{ Agrimonia. Thea. Beronica. Chamedris. Ribesium nigrum. Veronica. Hedera terrestris. Pimpinella. Euphrasia. Hypericum. Cochlearia. Nasturt.
3. Terreæ	{ Cauda Equina. Muscus. Pulmonaria. Solidag. Virga aurea. Bursa Pastoris. Verbena. Fol. quercus. Pyrola. Sanicula. Alchymilla. Pilosella. Polygonum. Adiantum. Capill. ♀. Polytrichon. Ceterach. Psyllitis.	{ Volatiles acres	{ Erysimum. Persicaria. Cuscuta. Epithymum c. pauc. laxant.	{ Centaur. min. Card. Bened. Fumaria. Scordium. Lupulus.
	{ Purgant.	{ Volatil. { Fixæ cum pauc. vol.	{ Fol. Senna. Soldanella. Gratiola. Nicotian.	{ Mercurialis. Parietaria. Violaria.



CLASSIS IV.  
DE FLORIBUS.

Flores sunt vel	{	Salini	{	Volatiles Oleosi	{	Lavendula.	
					Rosmarini.		
					Salvia.		
					{	Chamomilla	{ Roman.
							vulgar.
			{	Spirituosi blandi	{	Croci.	
					Schoenanthi.		
					Stoechadis.		
					{	Caryophyll. f. Tunic.	
						Liliorum Convallium.	
{	Acres vol. & fix.	{	Tilie.				
		Betonica.					
		{	Cheiri.				
			Calendul. c. amar.				
		{	Mucilaginosi	{	cum ☉. vol. pauco	{ Melilot. bland.	
						Sambuc.	
{	cum ☉. fol. & fix.			{ Papaver.			
				Pæon.			
{		{	cum mucilag. crass.	{ Malv. hortens.			
				Verbasc.			
		{	Aquosi tenues	{	Borrag.		
				Bugloss.			
Cyani.							
Violarum c. ☉. vol.							
{	Terrei	{	cum volatilitate	{ Nymphaea.			
				Rosarum.			
		{	cum austeritate	{ Balauftiorum.			



# CLASSIS V. DE FRUCTIBUS ET SEMINIBUS.

Fructus  
& Semi-  
na sunt  
vel

Fructus & Semi- na sunt vel	Aquosa	Tenuia	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. frigida. { <i>maj.</i> <i>min.</i></li> <li><i>Plantaginis.</i></li> <li><i>Intybi.</i></li> </ul>	Alterantia Volatilia	<ul style="list-style-type: none"> <li>cum subtili o acriore</li> <li><i>Caryophylli.</i></li> <li><i>Antophylli.</i></li> <li><i>Amomum Plin.</i></li> <li><i>Macis &amp; Nux mo.</i></li> <li><i>Cubeba. (schas.</i></li> <li><i>Cardamom.</i></li> <li><i>Ammi.</i></li> <li><i>Piper</i> { <i>Srot.</i> <i>long.</i></li> <li><i>Bacc. jun.</i> { <i>Grana Paradys.</i></li> <li><i>Anis. nost. &amp; Sinens.</i></li> <li><i>Foeniculi.</i></li> <li><i>Levistici.</i></li> <li><i>Anethi.</i></li> <li><i>Carvi &amp; Cumini.</i></li> <li><i>Bacc. Lauri.</i></li> <li><i>Carpobalsami.</i></li> </ul>
		Crassiuscula	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Alib. &amp; Malva.</i></li> <li><i>Aquilegia.</i></li> <li><i>Hyperici c. Res.</i></li> <li><i>Lin. cum o.</i></li> <li><i>Foenugrac. c. vol.</i></li> <li><i>Orobi. Cicer. Lupin.</i></li> <li><i>Faba.</i></li> </ul>		
		cum mucagine vol.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Hyosciami.</i></li> <li><i>Papaver</i> { <i>alb.</i> <i>nigr.</i></li> <li><i>Pæonia.</i></li> </ul>		
		Terrea	<ul style="list-style-type: none"> <li>cum austeritate</li> <li><i>Galla &amp; Gland.</i></li> <li><i>Sumach.</i></li> <li><i>Mespilus.</i></li> <li><i>Nux cupr.</i></li> <li><i>Bacc. Myrth.</i></li> <li><i>Cydon.</i></li> </ul>		
Salina , quæ vel	Subdulcia	cum o crasso	<ul style="list-style-type: none"> <li>cum blanda viscositate</li> <li><i>Bombac.</i></li> <li><i>Cannabis.</i></li> <li><i>Hordei.</i></li> </ul>	Alterantia Fixa	<ul style="list-style-type: none"> <li>cum lentore</li> <li><i>Bardana.</i></li> <li><i>Urtica</i> { <i>vulg.</i> <i>Rom.</i></li> <li>blandiora</li> <li><i>Alkekengi.</i></li> <li><i>Genista.</i></li> <li><i>Milii</i> ○.</li> <li><i>Rufci.</i></li> <li><i>Asparagi.</i></li> <li><i>Coffe.</i></li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Amygdal.</i> { <i>dulc.</i> <i>amar.</i></li> <li><i>Pistac.</i> { <i>Pini.</i></li> <li><i>Nuclei</i> { <i>Ceras.</i></li> <li><i>Anacar.</i> { <i>Persic.</i></li> <li><i>Cacao.</i></li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>cum dulced, viscosa</li> <li><i>Dactyl. Ficus.</i></li> <li><i>Jujub. Siliq.</i></li> <li><i>Sebesten.</i></li> <li><i>Rassula.</i></li> <li><i>Prun. Damasc.</i></li> </ul>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>volat.</li> <li><i>Mezereum.</i></li> <li><i>Pfillii.</i></li> <li><i>Staphisagr.</i></li> <li>vol. &amp; fix. c. amaritie</li> <li><i>Colocynth.</i></li> <li><i>Nux Vom.</i></li> <li>cum o crass.</li> <li><i>Granatill.</i></li> <li><i>Catap.</i></li> <li><i>Balan. myr.</i></li> </ul>	Purgantia	<ul style="list-style-type: none"> <li>blanda</li> <li><i>Atripi.</i></li> <li><i>San. buc.</i></li> <li><i>Cnici.</i></li> <li><i>Myrobal.</i></li> <li>cum aciditate</li> <li><i>Tamarind.</i></li> <li>cum dulci viscosit.</li> <li><i>Cassia fist.</i></li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Cardui</i> { <i>Bened.</i> <i>Maria.</i></li> </ul>		



# CLASSIS VI.

## DE CORTICIBUS, LIGNIS & FUNGIS.

Cortices sunt vel	Salini	Volatiles Oleosi	cum amaritie	{	<i>Aurantiorum.</i> <i>Citri.</i> <i>Chin. Chin. fals.</i>
			cum dulci viscos.	{	<i>Cinamomum.</i> <i>Cassia lignea.</i>
			cum amarit. & acido vol,	{	<i>Cass. Caryophyllata.</i> <i>Cort. VVinteran.</i>
			cum resina	{	<i>Guajaci.</i>
	Fixi		cum amarit.	{	<i>Chin. Chin. vera.</i>
			cum acredine	{	<i>Fraxini.</i> <i>Tamarisci.</i>
			cum nitrositate	{	<i>Capparum.</i>
	Terrei, quales sunt			{	<i>Castanearum.</i> <i>Granatorum.</i> <i>Quercus.</i> <i>Calices glandium.</i>

Ligna sunt aut	Salina	Volatilia	cum $\Theta$ . vol. $\odot$ .	{ <i>Sassafras.</i>
			cum resina	{ <i>Sanctum.</i> <i>Guajacum.</i>
			cum amarit. & resina	{ <i>Aloes.</i> <i>Asphaltum.</i>
			blanda	{ <i>Rhodinum.</i> <i>Sandalum</i> { <i>Citrin.</i> <i>Album.</i>
	Fixa		cum amarit.	{ <i>Colubrinum.</i>
			cum nitrositate blanda	{ <i>Nephriticum.</i>
			Purg. fix. & vol.	{ <i>Panava.</i>
	Terrea, qualia sunt			{ <i>Viscus quernus.</i> <i>Sandalum rubrum.</i>

Fungi sunt vel	Salini	cum blando $\Theta$ . odore	<i>Boletus Cervin.</i>
		cum $\Theta$ . purgant. vol.	<i>Agaricus.</i>
	Terrei, quales sunt		<i>Auric. Ind.</i> <i>Fung. Orbicul. seu Bovista.</i>




Succi, Resinæ  
& Gummata  
sunt vel

D 3



# CLASSIS VIII. DE MINERALIBUS.


Mineralia sunt vel





# LABORATORIUM PARISIENSE.

## INTROITUS.

 Vantoperè peregrinationes & itinera, versus Exteros suscepta, elegantioris *Literaturæ* Studiosis, cumprimis autem *Artis Medicæ* Cultoribus, sint proficua, præter alios Willius in tribus *Dissert. de Itineribus Philiatorum Germanorum* & Thomas Bartholinus in *Tractat. de Peregrinatione Medicâ* jamdudum ostenderunt. Prout autem varia sunt peregrinantium proposita scopique diversi, ita varia quoque illic requisita & cautela observanda sunt. Quemadmodum enim Theologo futuro ea, quæ sacra concernunt, templa fanaque publica, ritus & Oratores Ecclesiastici eorumque gestus cura cordique sunt: quemadmodum & Legum Statusque publici periti Regum Principumque Aulas & Curias præ aliis frequentant; ita Medici eorumque Cultores de Hortis publicis, Laboratoriis Chymicis, Theatris Anatomicis & Nosocomiis invisendis magis sunt solliciti, quæ Lutetia Parisiorum, in Suburbio S. Victorii, conjunctim & simul spectari possunt, cum in atrio Horti Regii non tantum Laboratorium Chymicum, sed & Theatrum Anatomicum & Museum Curiosum: E regione verò maximum Ludovici Nosocomium spectentur. Ut autem agris hic denso agmine debumbentibus eò facilius & promptius succurri possit, hinc laboratio proxime adjacet Pharmacophylacium pauperibus dicatum, in quod omnia illic à Chymico Professore elaborata reponi solent, ut è seq. Inscriptione foribus adscripta, elucescit:

REGIS CHRISTIANISSIMI  
LUDOVICI XIV.  
IMPERIO,

ET  
EMINENTISSIMI CARDINALIS

MAZARINI

MUNIFICENTIA,

ANTONIUS VALLOT

ARCHIATRORUM COMES

OFFICINAM HANC PHARMACO-CHYMICAM  
IN PAUPERUM SUBSIDIUM ET PUBLICI COMMODI GRATIAM  
EXSTRUXIT ET INSTRUXIT.



*Et quamvis laboribus Chymicis, publicè illic institutis, Pharmacopæus quidam Regius defungi soleat, ut plurimum tamen id sub directione Professoris & Horti Regii Inspectoris fieri, è sequenti Programmate, ex Prodromò Commentarii in Petri Severini Medicinam Philosophicam, à Wilhelmo Davissonio editi, petito videre licet :*

# AUSPICIIS REGIIS WILLIELMUS DAVISSENIUS,

Scotus, Confiliarius & Medicus Regius,

Horti Regii Plantarum Medicinalium

PRÆFECTUS,

**B**otanicum & Chemicum Fontem aperiet cognitionis & scientiæ cupidis. Ex illo studiosum cultum, novum ordinem plus septingentarum plantarum accessionem videbunt. Ex hōc Animalium, Vegetabilium & Fossilium Analysin accipient. In Antimonii præparatione & exaltatione multus erit: quia non sufficiunt nomina ad tam divitem naturam appellandam, quæ principium vitæ, balsamum & medentem mumiam in se habet. Verum verum dico. Non est sub cœlo medicina sublimior.

In Aula Horti Regii Plantarum Medicinalium, quæ Parisiis est, die 23. Jul. & deinceps horâ sextâ matutinâ. Anno 1648.

In Suburbio S. V. A.

*Idem temporibus subsequētibz quoque ad nostrum usque seculum obtinuisse vel exinde constat, quod Botanicus toto Orbe Celeberrimus, Joseph Pitton de Tournefort, præter Scholas & Demonstrationes Botonicas, nunquam non elegantiores etiam Medicamentorum Chymicorum præparatione Auditoribus suis instillaverit: quarum descriptiones quum haud ita pridem, una cum Aetiologiis & usibus, à Venerando Dn. Parente meo adjectis, obtinuerim; haud ingrātum fore duxi harum rerum Curiosis, si easdem reliquis Tournefortii laboribus, in compendium redactis, hic martitavero, non alium in finem, quam ut propriis æque ac Commilitonum studiis velificando gloria DEI T. O. M. Proximique commodum indies magis magisque amplificetur. Dab. Giessa è Museo, die 18. Martii A. 1715.*

CHRISTOPH. BERNHARD. VALENTINI, M. C.













FURNI

CHYMICI





# INSTRUMENTA

seu

# VASA CHYMICA

*Separatio Olei ab aqua per gossypium*



*Separatorium  
Olei ab aqua*



*Vas rectificatorium.*



*Concha*

*Phiola*




*Cucurbita.*



*Cucurbitæ  
Circulatoriæ*




*Serpentina pro rectific.*



*Retorta cum excipulo*



*Infundibulum.*



*Circuli*








# LABORATORII PARISIENSIS

## PARTITIO I.

De

## LABORIBUS ANTIMONIALIBUS.



Antimonii virtus inexhausta est, cum tot ex illo Medicamina Emetica, Purgantia, Diaphoretica, Antifebrilia, Nervina, Cathartica, &c. parentur, ut integrum ferè Myrothecium portatile quis exinde construere possit. Agmen inter illa ducit

### I.

### *Crocus Metallorum,*

quem Dn. Autor ita parare solebat:

℞. ⚥. & Ⓞ. partes æquales, M. & materiam cochleari ferreò per vices injiciendo in mortariò ferreò ignitò detona. Operatione peractâ materia refrigerata liberetur à Scoriis, & vocatur Epar Antimonii, ob colorem obscurè rubescentem. Hoc Epar ⚥. pulverisatum & in aquâ solutum ad fundum dilabi sinit pulverem magis flavescentem, qui Crocus Metallorum vocatur.

### *Ratio procedendi.*

Quandoquidem particulæ Antimonii ⚥reæ & salinæ (à quibus virtus ejus dependet) compluribus terreis & metallicis implicitæ sint, hinc clavi quadam opus erat, quæ texturam ejus reseret, & particulas activas extravertat. Hunc in finem Ⓞ ana additur, cujus particulæ cum ⚥ sub accensione, non secus ac cum ⚥ communi in pulvere pyrio, fragorem quasi fulminantem edunt, texturamque Antimonii aperiendo & laxando in causa sunt, ut reliquæ particulæ salino-sulphureæ sibi jungi & pulverem hunc obscurè rubescentem aut flavescentem, ope reflexionis luminis, constituere valeant.

### *Ufus.*

Crocus hic fons & scaturigo est Emeticorum præstantissimorum, quamvis ipse in substantiâ, (quod ajunt) internè minus tuto propinetur, sed tantum in infuso, hæc ferè ratione:

℞. Croci Metallorum. gr. iv. vel v. infund. per noct. in Vin. Rhen. aut Malv. ℥ij. vel ℥iij. stent in loc. cal. manè filt. per chartam. Dos. ab ℥j. ad ℥ij.

Hæc ratione fit *Aqua benedicta Rulandi*, & si infusio in + fiat, facile cum saccharo q. s. in Oxyfacherum Emeticum, aut *Syrupum emeticum A. Sala* converti potest. Externè tamen in substantia Clysteribus acrioribus, pro excitandis Apoplecticis & Lethargicis, potest addi seq. in modum:

℞. Vini alb. lib. j.

bulliat in eo sem. Coloc. in pet. lig. ℥ij. add. Croci metall. ℥ss. M. F. Clyster.

Laudatur etiam in Collyriis, ad complures oculorum affectus; unde & Abyssinos ex ⚥ cohol suum, (quò ope penicilli tunicam annatam nigredine inficiunt) preparare DN. LUDOLFUS in Comment. ad Hist. suam Æthiop. adstruit.

### II.

### *Tartarus Emeticus.*

A.

℞. ☐ candidissimi crudi ℔iij.

Vitri ⚥. ℔j. M. in olla vitreata, cui affunde aq. fontanæ pint. iv. Digere igne lento per 8. dies. Postea materia fervens trajiciatur per pannum: Liquor trajetus reponatur in hypocausto & post spatium aliquot horarum crystall. ad vasis latera concresecunt, qui separentur. Liquorem residuum ad tertiam partem evapora, & de nuò alii crystalli concresecunt. Evapora denuò, ut residuos extrahere possis.

### *Ratio procedendi.*

☐ Cum Vitro ⚥ digeritur, ut non secus ac in priori operatione particulis ⚥reis imprægnetur: His enim vim emeticam in acceptis ferendam esse, vel exinde patet, quod in ⚥ crudo, ubi nondum

E

extra-



extraversa sunt, vis emetica desideretur, non secus ac in ☿ diaphoreticò, ubi nimium figuntur aut abiguntur. Quando igitur ipsum ☿, aut minera ejus, sive in terræ visceribus à natura (quale mihi ad manus est) aut enchiresi Chymica calcinatur, utrobique etiam particulæ ☿reæ sub agitatione à reliquiis extricantur, quibus & color puniceus aut succineus adscribendus est. Si enim caput mortuum post cinnabaris & butyri ☿ sublimationem in vitrum mutaveris, ob defectum particularum ☿rearum plane album & omni vi emetica destitutum erit, observante WILLISIO, in Pharm. Rat. S. 4. c. 4. p. 38. Cur autem Vitrum ☿ potius, quàm Crocum Metallorum ☿ hic combinet Autor? ratio forte est, quod particulæ vitri antimonialis, tanquam crassiores, non tam facile poros lacinia, per quam colari debet ☿ imbutus, transeant, quàm crocus metallorum, qui in substantia assumptus pessima symptomata inducere valet. Inde enim est, quod ☿ emeticus, etiam cum croco metallorum absynthiaco paratus, tantas sæpe hyperemeses & hypercatharises moveat, ut Medicos noverim celeberrimos, qui voto se adstrinxerunt, quod nunquam illò posthac in Praxi usuri sint. Postquam enim à Pharmacopœis (descriptioni MYNSICHTI hîc strictè inhærentibus) solutio ☿ croco metallorum ebria per manicam Hippocratis colatur, non possunt non particulæ quædam è croco affricari ☿, quæ intus assumptæ turbas ejusmodi ciere solent. Quod si è contra Tartarus Emeticus, LUDOVICI more, è croco metall. ac ☿ purioris vel crySTALL. ☿ ana in duodecuplo ▽ calidæ paretur, digeratur, coquatur, calideque per duplicem chartam bibulam filtretur, tantum abest sinistros hujuscemodi effectus inde pertimescendos esse, ut potius eundem infantibus, etiam anniculis, tutissimè propinarim.

### Usus.

☿ Emeticus est amplissimus, siquidem omnes ventriculi cruditates, morbis quamplurimis, tam chronicis, quàm acutis, fomitem præbentes, longè certius & tutius, quàm decantata hodie ventriculi excutia (*die Magenbörst* vulgò dicta) tollit & quasi vectibus excludit. Hinc non tantum anorexiam, apepsiam & dispepsiam, cardialgiam & alios stomachi affectus, sed & varios inde per consensum exortos morbos, cephalalgiam, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, lethargum, tinnitum aurium &c. eo radicitus extirpare possumus. Quid in febribus, tam intermittentibus, quàm continuis, etiam malignis, præstet, ipsa Praxis loquitur, cum utrobique unicum emeticum, tempestivè adhibitum, aut sufficiat, aut fundamentum pro curâ feliciori jaciatur. In Dysenteria Ipecacuanhæ succedaneum esse in Polycrestis exoticis jamdudum ostensum est. In venenis, phlitis & similibus assumptus in principio omnibus alexipharmacis palmam eripit. Interim & cautela, à MYNSICHTO tradita, ante ejus exhibitionem probè expendenda sunt, ne in picrocholis & ad vomendum difficilibus movendo quid, sed non promovendo, cardialgiam, in gravidis abortum, in chlorosi & menstruorum obstructione anxietates aut convulsiones & in phthisi confirmatâ hæmoptysin lethalem procreemus. Ex altera verò parte nec meticulosi nimis aut superstitiosi simus, si vel in Hæctica aut Phthisi incipiente vomitorii usus indicetur, cum LUDOVICO teste plures ex emeticorum & opiatorum intermissione pereant, quàm illorum usu.

*Sit modus in rebus, sint certi denique fines.*

*Temporibus Medicina valet, data tempore profint,*

*Et data non apto tempore multa nocent.*

*Dosis* in infantibus est gr. β. ad j. In Adultis à gr. ij. ad iij. In durissimis gr. iv. aut ad summum v. Præscribitur ita:

℞. ☿. emet. gr. iij.

Sacch. gr. vi.

M. F. Pulv. pro dosi.

### III.

## *Antimonium Diaphoreticum.*

℞. Reguli ☿. pulveris. ℔β. M. cum

Ⓢ. candidissimi ℔bj. & detona in crucibulo: Pulverem gryseum, scoriis liberatum, solve in aquâ communi fervente: Solutionem filtra, & in filtrò remanebit pulvis candidissimus, qui iteratis vicibus edulcorandus, & nomine ☿. diaphoretici asservandus. In solutione post aliqualem evaporationem concreverint crySTALLI ex Ⓢ, qui *Nitrum antimoniatum* vocantur.

### *Ratio Processus.*

Quum particulæ ☿. ☿reæ, ut in antecedentibus demonstratum fuit, vomitum ciere soleant; hinc ad obtinendam solam vim diaphoreticam, aut absorbentem, illæ penitus subjugandæ erant. Fit autem hoc per additionem Ⓢ. in majori, quam ad reclusionem ☿ requirebatur, quantitate, qua aut omninò figuntur, aut sub detonatione violentiori penitus abiguntur sulphureæ ejusdem portiunculæ; eumque in finem in vulgari ☿. diaphoretici præparatione ☿. crudo triplum, aut quadruplum Ⓢ. additur, hæcque simul aut trinâ, aut (quam alii magis laudant) unicâ detonatione in pulverem illum diaphoreticum convertuntur. Cur autem in processu Autoris nostri Regulo ☿ tantum duplum Ⓢ. addatur, ratio est, quod sub præparatione Reguli ☿ Salia alcalia ☿ & Ⓢ. fixi, tanquam nimis caustica & corrosiva (explicante ETTMULLERO in Colleg. Chym.) multum de ☿. jam absorpserint & in scorias deposuerint, unde tantum Ⓢ. non requiritur, quantum in detonatione ☿. crudi, juxta vulgarem



garem procedendi modum, necessarium erat. Non enim omne è Regulô Antimonii  $\Delta$  ablatum esse, tum infusiones & pocula emetica è Reg.  $\S$  parata, tum *Regulus*  $\S$  *Medicinalis*, à multis hætenus contra febres intermittentes in arcanis habitus, testantur, utpote qui præter sudorem sæpe vomitus quosdam, non sine euphoriâ, movet, & secundum VIGANI ductum ita paratur:

Rx.  $\square$ . part. j.

$\ominus$ . commun. part. iv.

$\S$ . part. v. M. & fundantur in Regulum.

### Usus

$\S$  Diaphoretici ex ipso nomine & cognomine innotescit. Quamvis enim WILLISIUS in Pharmac. Ration. Sect. V. Cap. I. virtutem ejus diaphoreticam in dubium videatur trahere, nesciendo cujusmodi ejus particulis vis hæc debeat attribui, adeoque pro sistendis feri aut sanguinis fluxionibus tantum commendet, eò quod hæc terra propriis salibus orbata alienos (quibus fortè in corpore nostro occurrit) acidos sales imbibat, sicque absorbendo magis agat; attamen & hoc intuitu reliquos humores circulantes ab acido vindicando & ad liberaliorem transpirationem disponendo diaphoresin, experienciâ teste, egregiè promovet, eaque de causâ in febribus intermittentibus, ETTMULLERI verbis, plus confert, quàm specificum antifebrile Crollii, aut Strobelbergeri, cum primis, si cum  $\ominus$ . armoniaco (in Hæctica cum  $\oplus$  sociato) propinetur. Non minus in febribus continuis, tam benignis, quàm malignis petechialibus, pleuritide benigna & malignâ, erysipellate aliisque à sanguine plus minus grumoso oriundis morbis, salibus volatilibus CC. succini, cinnabarinis, & quandoque opiatidis maritatum, est egregium. Quid quod & in Lue Venereâ diaphoreticum non contemnendum constituat, cum primis è Regulo  $\S$ . ad ductum Autoris nostri paratum, & *Cerussa*  $\S$  *alis* nomine alioquin cognitum, utpote quod præter effectum diaphoreticum salivationem quandam, & rialibus aliâs familiarem, excitare dicitur ab ETTMULLERO, in Collegio Chymico. *Dosis* ejus est à  $\mathcal{E}$ j. ad  $\mathfrak{z}\beta$ . Prescribitur ita:

Rx.  $\S$ . diaphor.  $\mathcal{E}$ j.

$\ominus$ . vol. CC. gr. v.

Ther. coel gr. ij. M. F. Pulv.

### IV.

## *Diaphoreticum Martiale anticachecticum.*

Rx.  $\S$ . crudi pulveris.

Squamarum ferri ana p. æ.

M. probè atque inde crucibulo, quod expone igni forrissimo & materia liquefcet, vel in massam concrefcet. Hæc fluens ex crucibulo in pavementum projicitur, ut refrigeretur: abhinc pulverisatur atque cum duplo  $\oplus$  mista detonatur, prout in præcedente  $\S$ . diaphoretici præparatione fieri solet. Tandem in aquam frigidam injecta pluribus lotionibus edulcoratur. Quod si verò materia hæc in massam concrefcet, hæc per integram horam in igne relinquitur & probè ignitur, hocque factò præparatur ut ante dictum.

### *Ratio procedendi*

Eadem, quæ in præcedenti operatione, subest, nisi quod ad majorem vim absorbentem medicamento conciliandam addatur  $\oslash$ . acido p. n. in hypochondrio & primis viis nidulanti chronicosque morbos alenti quam maximè contrarius.

### Usus

Ejus in cachexiâ & chlorosi, in Ictero, dysenteriâ malignâ omnibusque affectibus cutaneis, scabie & similibus non satis decantari potest à LUDOVICO, in Pharmacia moderno sæculo applicanda, ut & Miscellaneis S. R. I. Academ. Nat. Curios. Dec. I. Anno VIII. Obs. LXV. *Dosis* est  $\mathcal{E}$ j. ad  $\mathfrak{z}\beta$ . Prescribitur ita:

Rx.  $\S$ . diaphor.  $\oslash$  tis.

Flor.  $\Delta$ .  $\bar{a}\bar{a}$   $\mathfrak{z}\beta$ . M.

D. bis de die in scabie.

### V.

## *Regulus Antimonii $\oslash$ alis.*

Rx. Clavorum ferreorum  $\mathfrak{t}\mathfrak{t}\beta$ . in crucibulo cooperto igni fusionis exponantur, donec exactè fuerint igniti: cujus indicium est, si forcipe exempti & aëri expositi non statim nigrescunt. Tum adde  $\S$   $\mathfrak{t}\mathfrak{t}\beta$ . fundantur simul per horam circiter: Postea injice per vices  $\oplus$ . purissimi pulverisati præter propter pugillos octo: relinque adhuc per quadrantis horæ spatium in igne: abhinc injice, vel mortario ferreo, vel cono fusorio. Refrigeratum Regulum libera à scoriis, atque denuo in



igne funde, addendo, ut ante, pugillos aliquot  $\oplus$ . & si lubet, multoties hanc præparationem repete, ut politior & conspectior fiat stella.

### Ratio Processus.

Quum  $\S$  facilimè,  $\oslash$  verò difficulter in  $\Delta$  fluant, hinc non simul fundi, sed ferrum prius candefieri debet. Abhinc simul fusa abeunt in unam massam, quum  $\Delta$   $\oslash$  &  $\Delta$   $\S$ , in radice conveniant, & se invicem facilè uniant, quod à  $\oplus$  fixo postmodum absorptum in scorias abit, è quibus haud difficulter præcipitari potest.

### Usus

Reguli hujus  $\oslash$ ti expetitur à nonnullis ad antimonium diaphoreticum  $\oslash$ ale, exinde per detonationem cum triplo  $\oplus$  parandum: sed præstat compositio Autoris. Reliquas virtutes cum Regulo  $\S$  vulg. & simplici communes habet.

## VI.

### Sulphur auratum $\S$ .

$\Re$ . Scorias Reguli  $\S$  vel croci metallorum, vel & antimonii diaphoretici, pulverisa ac solve in aqua communi, cui filtratæ affunde acetum destillatum, & pulvis ruber ad fundum præcipitabitur, qui exsiccatus Sulphuris aurati  $\S$  nomine venire solet.

### Ratio procedendi.

Quandoquidem Scorix, in Regulorum præparatione remanentes, & in summitate coni fusorii reperibiles, nihil aliud sunt, quàm salia alcalia sulphure  $\S$ , quod absorpserant, imprægnata, hinc ad hujus separationem & præcipationem solutioni illarum contrarium quid, sc. acetum instillandum erat, juxta regulam Chymicorum: Similia similibus solvuntur: Contraria contrariis præcipitantur.

### Usus

Admodum variat, pro diversa  $\equiv$ num repetitione. E primis præcipationibus vomitorium: è mediis purgans per inferiora: ex ultimis certâ ratione institutis, antepilepticum nobilissimum, Panaceæ Glauberi analogum, obtinebis, ad pauca tantum grana propinandum. Solutio scoriarum, seu lixivium, per instrumentum Glauberi, aut phiolam oblongiori collo instructum, sub formâ suffitus menstrua prolicit: In Clysteribus alvum ciet: Lotione autem scabiem & ulcera antiqua cacoëthea, imò ipsam gangrænam instantem abigit, cum partibus salinis abstergentem, sulphureis verò balsamicam virtutem exferat.

## VII.

### Cinnabaris Antimonii.

$\Re$ .  $\S$  pulverisati &  $\S$  sublimati ana, misce exactè in mortariò marmoreò, & ex retortâ vitreâ ampli & longioris colli in  $\oslash$ . igne mediocri destillata dant Butyrum  $\S$ . Postmodum augetur ignis, daturque insuper ignis suppressorius, & in collò retortæ sublimabitur Cinnabaris  $\S$ , quæ fractâ retortâ colligenda, & cum capite mortuo in duobus crucibulis, sibi superimpositis, (quorum commissuræ probè lutatæ sint, oportet) denuò sublimanda est. In hac ultimâ autem præparatione ea notanda est enchiresis, ut ignis non superet crucibulum: Si enim superius quoque attigerit, operatio non succedit. In Butyrò  $\S$  simul etiam aliquid  $\S$  vivi in recipiens transit, quem ut separes, infunde butyrum in infundibulum, cujus tubulum inferiorem digito obtura, tum  $\S$  seu argentum vivum, utpote corpus gravius, descendet: quem remoto digito per tubum transmittere poteris in vas suppositum: Hunc tandem ablue probè cum aqua aliquoties & per corium trajice. Talis  $\S$ , *resuscitatus* vulgò dictus, purissimus & ab omni adulterio immunis est.

### Ratio Processus

Elegantissimi consistit in seqq. Spiritus sc. acidus in  $\S$   $\equiv$  (è corpore  $\S$  & spiritu  $\ominus$  in  $\S$   $\equiv$  concentratò constante) ignis beneficio exsuscitatus & resolutus rodit partem metallicam seu Mercurialem antimonii corrosamque secum in recepraculum præcipitat, ut ita maritati abeant in liquorem crassiusculum, odore admodum sulphureo, ob  $\Delta$   $\S$  inibi resolutum, gaudentem, qui ob similitudinem, quam cum butyro ratione consistentiæ habet, Butyrum  $\S$  vocatur. Interea  $\S$  seu argentum vivum à spiritu  $\ominus$ , partem metallicam rodendo devorante, derelictus & à vinculo ejus liberatus, partim sub antiqua formâ cum butyro  $\S$  pròdit, partim se cum  $\Delta$  antimonii conjun-



conjungit, quæ duo subjecta tandem in tertium, ex illis compositum, sc. *Cinnabarim* ☞ abeunt.

### Usus

Horum productorum & Pharmacopœis & Medicis admodum proficius est. Priores enim unicum in hanc operationem nummum uncialem impendendo, ex calculatione LUDOVICI, juxta communem Myropolarum taxam, centum Imperiales inde lucrantur. Medici pharmaca inde contra morbos contumacissimos, tam internè, quàm externè adhibenda obtinent. Illic *cinnabaris* ☞ in omnis generis convulsionibus & ipso caduco medicamentum præbet nobilissimum, adeò quidem, ut elogium illud, quod trium Imperatorum Archiater CRATO cinnabari nativæ, quam Magnetem epilepsiæ vocat, tribuit huic cinnabari ☞ etiam deberi dicat ETTMULLERUS. Cum primis autem Epilepsiæ accidentali omnibusque doloribus viscerum fibrarumq; nervosarum spasmodicis validè resistit, sicque in Colica convulsiva, à fumis & evaporationibus mineralibus oriunda (*in der Bergfage*) in tremore aurificum à frequenti ☞ evaporatione, in doloribus hystericis & arthritide, tam fixa, quam vaga, egregiè sese gerit. In erysipelate, in specie caput affligente aliisque capitis affectibus tantum valèt, ut à Practico quondam felicissimo D. MICHAELE in specificum cephalicum recepta fuerit. In febribus, cum primis malignis, sua quoque laude non caret, adeò, ut POTERIO sudoriferum antipestilentielle dictum fuerit. Multum quoque in morbis puerperarum præstat, non tantum dolores post partum & spasmos uterinos sistendo, sed & partum ipsum, ob contractionem uteri spasmodicam retardatum, promovendo. Dosis est ℥ss. ad ℥j. sive sola, sive cum ☞ volat. CC. succini &c. detur, quæ sine ullo periculo illi combinari possunt, dum è contra alia salia fixa ipsi non sint maritanda, ne in concretum ☞ ☞ simile cum illis abeat. Præscribitur ita:

℞. Cinnab. ☞. ℥j.

☞ vol. CC.

Succini āā. gr. v.

Ther. coel. gr. j.

M. pro dosi.

Externè *Butyrum* ☞ potissimum ad excitandos fonticulos, ad eradicandos abscessus malignos, carbunculos pestilenciales, gangrænam & sphacelum summoperè laudatur, de quibus pluribus in Prax. infallib. Part. 2. Chirurgicâ agitur. De spiritu ☞ Philosophicò, ☞ vitæ & Bezoardico minerali inde præparandis eorumque usibus in specie jam, Autoris nostri ductu, paucis adhuc tractandum est.

## VIII.

### *Bezoardicum Minerale.*

℞. Butyri ☞ ℥ij. affunde per vices ☞ ☞. ℥xij. postmodum ☞ ☞ abstrahitur igne vehementiori, ut materia sicca remaneat, quæ albida est; hinc pluribus lotionibus edulcoratur, vel etiam V cum eadem digeritur & abhinc deflagratur.

Aliàs autem cum Croco metallorum ita fit:

℞. Croci metallorum ℥ij.

☞ ☞. ℥xij.

M. in retortâ: ebullitione & fumis cessantibus procedatur, ut supra.

### *Ratio procedendi.*

In hujus præparatione WILLISIUS observat, quod, dum liquores hi acerrimi committuntur, sales mox sibi invicem occurrentes strictè combinentur. Interim particulæ sulphureæ, quæ uberi copiâ suppetunt, prorsus exclusæ & manu qf. missæ avolant, atque salina quædam corpuscula secum auferentes calorem & fumum (qf. aliquid actu combureretur) valdè tetrum cient: quibus abactis salinæ relictæ eum paucis ☞ terreis strictè combinantur, demumque ignem passæ, ut ☞ emeticum penitus exhalet, atque salia aculeis corrosivis priventur, diaphoreticum insigne constituunt, quatenus ☞ medicamenti corporis nostri salibus occurrendo & qf. imbibendo sanguinis & humorum circulantium compagem laxant, ut particulæ serosæ eò facilius secedere possint.

### Usus

Intuitu Bezoardicum Minerale optimum est sudoriferum in febribus omnis generis, cum primis malignis, petechiis & ipsa Peste: si quidem in Peste Neapolitanâ egregiè profuisse dicitur. Valet quoque in scabie & aliis morbis cutaneis. Dosis à gr. viij. ad gr. x.



## PARTITIO II.

De

## MERCURIALIBUS.

Quemadmodum servi fugitivi rarò absque spolio se subducunt, ita Mercurius, illis accensus, è priori tmemate pulverem quendam rapuit, suoque nomine insignivit, qui

## I.

*Mercurius Vitæ,*

Aliis autem *Pulvis Algaroth* audire solet, cùm, si genuinos ejus natales spectemus, potius ad Antimonialia referendus sit. Paratur enim ita:

℞. Butyri ☿ rectificati q. v. infunde in ∇ communem, quæ exinde lactescet, & successivè in fundum secedet pulvis albus, ☿ vitæ nominatus. Aqua autem illa, in qua præcipitatus est Mercurius vitæ, si destilletur & à phlegmate separetur, exhibet spiritum acidum, qui vulgò *Spiritus ☿ Philosophicus* vocatur.

*Ratio procedendi.*

Cum butyrum ☿ nihil aliud sit, quam Regulus ☿ à salibus eorumque ~ acido corrosus, hinc, si aquâ affusâ salia illum compedibus quasi detinentia solvantur, pulvis ille regulinus gravitate suâ fundum petit, qui hanc ob causam ☿alis potius, quàm ☿ialis est prosapiæ, quod tam à priori, quam posteriori demonstrari potest. Illuc enim spiritus mineralium acidi, ob texturæ mechanicæ, libentius cum metallis & semi-metallicis (quale ☿ est) corporibus se jungit, quam aliis. Hic ☿ vitæ fusus 1. in crucibulo in pristinum ☿ corpus reducitur. 2. Etiam sine additione ☿ ☿ ex ☿ obtinetur, quando butyrum ☿ destillatur ex ☿, regulo aut & vitro ☿ cum ~ ☿ saturatis, aut ☿, ☿ & lateribus contusis adjectis, quod ETTMULLERUS sequenti ratione fieri docet:

℞. Antimon. part. j.

☿. decrepitat. part. ij.

☿. ad albed. calcin, part. iv.

Misc. & destill. per retortam, & obtinebis butyrum ☿, sed absque cinnabari, ob defectum ☿. è quo tamen eadem, ut in priori processu, ratione ☿ vitæ præcipitari potest. E quibus ad oculum patet, Mercurium vitæ, vulgò ita dictum, non tam à ☿riò, quàm ☿ procedere, Q. E. D.

*Usus*

Ejus multis est exosus, adeò, ut ob successus infelices eundem potius *Mercurium mortis*, quàm *vitæ* dicere malint. Ast partim injuriam faciunt præparato huic, partim falsâ hypothesi nituntur, existimantes hoc ipsum à ☿ ☿. procedere, quod tamen falsissimum esse, ex antecedentibus haud difficulter colligi potest. Quin dantur potius casus, ubi necessarius ejus usus est, v. g. in apoplexiâ, paralyti linguæ & deglutitione impedita, in quibus ori inflari, aut linguæ imponi poterit. Mitior tamen est qui è regulo ☿; & quidem ☿ali, paratur, quia sub hujus calcinatione ☿ subtile partim avolat, partim à sulphure fixiori ☿ corrigitur. Quid quod adeò domari possit, ut tantum per inferiora laxet, sicque ☿ *per inferiora laxans* audiat, si sc. per lixivium ☿ præcipitetur, aut V ☿risatus ab eodem aliquoties abstrahatur. Dosis ejus in substantia sunt gr. ij. & in infusò (quod tutius) gr. v. Infunditur autem in vino per noctem, abhinc per chartam filtratur & ab ☿i ad ☿iβ. exhibetur.

Quod stigma acidum, post ejusdem ☿nem remanens, attinet, illud nihil aliud est, quàm aqua ~ ☿. imprægnata, qui facile inde per distillationem à ☿ separando obtinetur; unde rectius *Spiritus salis Philosophicus*, quam ☿ aut ~ ☿. Philosophicus diceretur, cum in ☿one ☿ de ☿ nihil ascendat.

Usus ergò hujus phlegmatis quodammodò coincidit cum ~ ☿ dulci, ejusque intuitu *Tinctura florum bellidis* (quæ cum illo extrahitur) tam egregia & decantata est in restinguenda siti: & ardore febricitantium, infundendo saltem 30. vel 40. guttas in pintam potus ordinarii.

Inter ipsa autem ☿rاليا propriè verèque sic dicta reliquorum fundamentum est.

## II.

*Mercurius sublimatus,*

Qui ita commodius paratur:

℞. ☿ in ∇. soluti.

☿ exsiccati.

☿. decrepitati ana lib. j.



Misc. exactissimè & ætus è cucurbitâ humili; cucurbitæ hujus commissura s. orificium ab initio non adeò exactè claudatur, ut ꝑ salium quodammodò exhalare possit: Vaporibus verò albis comparentibus exactissimè obturetur circumcirca, Δ. gradatim augeatur & ꝑ ætus in formâ Θ. crystallini superiori sublimatorii parti adhærebit.

### Ratio procedendi.

Hic Mercurius seu argentum vivum à salibus-in ∇orti æquè ac mineralibus additis, dissolutus cum hisce à substrato igne in sublime fertur & propellitur, à quibus partim absorprus quasi & in poros eorum receptus albedinem crystallinam acquirit & ob particulas illorum acutas, superficiem ejus obsidentes, tantam corrosivitatem nanciscitur, ut venenorum arsenicalium instar omnes viventium partes arrodât & corrumpat, juvante spiculorum aculeorumque actionem ejus mobilitate.

### Usus

Ejus internus omninò nullus est, cùm præsentaneum sit venenum, & sive studiò vel malitiâ, sive per errorem loco ꝑ dulcis, intus propinatus homines & bruta statim jugulet, prout casus in Pandectis & Novellis Medico-Legalibus attestari possunt. Hinc pessimè & periculosè agunt omnes, quotquot ad salivationem maturandam aliquot grana ꝑ æti intus dare solent. Externè in affectibus cutaneis, maculis, nævis & stigmatibus eradicandis laudatur, unde WILLISIUS aquam suam cosmeticam inde parat, quæ vid. in Pharm. Rat. sect. 3. c. 5. in fine.

Ex hoc sublimato fit

## III.

### Mercurius Dulcis.

℞. ꝑ æt. ʒiv.

vivi s. commun. ʒiij.

Misc. probè in mortariò marmoreò, cum pistillò ligneò: postmodum sublimentur ter vel quater in phiola breviori. Sublimationem hanc si repetiveris duodecies, obtinebis *Panaceam Mercurialem*.

### Ratio procedendi.

Quum particulæ argenti vivi sint globulosæ, hinc ꝑ sublimato de novò junctæ spiculisque ejus appositæ impediunt, quò minus aculeis suis fibras sensiles vellicare & quacunque ratione violare possint, haud aliter ac globuli ex cera sigillatoriâ aciculis aut acubus affixæ punctiorem illarum impediunt; & hanc ob causam *dulcis* audit, non ratione saporis, qui adhuc salinus est, sed tatione efficacix, quia dulcium instar levius & mitius in linguam & partes agit. Quod si tamen sapor ejus acerbus nimium, amarus & acris sit, aut operatio minus legitima, aut ꝑ ætus arsenico adulteratus fuerit, tormina atrocia inferre solet, ut in Novell. Medico-legalibus supra citatis observatum fuit. Arsenicale autem virus in ꝑ æto agnoscitur, si ab ☉ ꝑ p. d. superinfuso nigrescat: Sin verò ꝑ dulcis ab ☉ ꝑ affuso flavescat, signum est dulcificationis minus legitimè peractæ, unde de novo c. ꝑ vulg. sublimandus est. Quo sæpius enim repetitur hæc dulcificatio, eò tutior est ꝑ dulc. Unde Gallorum *Panacea Mercurialis* tanto operè laudatur, de cujus præparatione & utendi modo, in Regio Nosocomio Invalidorum Parisiis recepto, plura vid. in Polychrestis nostris Exoticis de Panacea ꝑriali.

### Usus

Mercurii dulcis satis frequens est in Praxi, cum purgans nobilissimum constituat in cachexia pituitosa, lencophlegmatia, catarrhis, affectibus cutaneis & cum primis in Luc ꝑreâ. Quia verò ꝑrialia dentibus sunt infensa, hinc non tam in forma pulveris, quam boli, aut pilularum danda sunt. Dosis ejus est à ʒß. ad ʒj. cum stimulo, v. g.

℞. Extract. panchymag.

helleb. nigr. āā. ʒß.

ꝑ dulc. ʒj.

Scammon. ʒrat. gr. iij.

c. s. q. Syrup. ros. sol. F. Pil. pond. gr. j. consperg. pulv. liquirit.

Pilulæ tales non sunt deaurandæ, cum aurum foliatum ꝑ vulgi qf. revivificare sibi que jungere possit, unde ꝑ æt. conipedibus solutus tormina in corpore movere solet. Experto crede Ruperto.

*Panacea ꝑrialis* intus (ascendendo & descendendo in dosi) sumpta salivationem movet, & ita Luem ꝑ funditus extirpat. Vid. alleg. Polychresta exotica,

Externè ꝑ dulcis scabiem, pediculos, cinnices & alia insecta, haud secus ac ꝑ vulgi, curat & enecat. Vid. Musei Museorum Tom. I. Tit. de ꝑ.

## IV.

### Mercurius præcipitatus albus.

℞. ꝑ sublimat. ʒij.

Θ \* ʒiv.

Solv. in ∇. fontan. pint. ʒ. Solutioni filtratæ affunde ☉ ꝑ p. d. ʒvj. agitato



agitato liquori affunde  $\nabla$  fontan. pint. ij. Trajice per chartam & huic adhærens pulvis vocatur.  $\text{☿}$   $\text{☿}$  albus.

### *Ratio procedendi.*

Ut connubium  $\text{☿}$  cum salibus tollatur, additur  $\ominus$   $\ast$ , quo facto è solutione per contrarium  $\text{☿}$   $\text{☿}$ . alcalinum facile præcipitatur  $\text{☿}$ , qui albicat, cum sulphur ejus per  $\ominus$   $\ast$  solâ solutione in tantum non extrahatur, quàm si in spiritibus mineralium acidis solvatur, prout in seqq. videre licet.

### V.

#### *Mercurius præcipitatus ruber.*

$\text{☿}$ .  $\text{☿}$  crudi  $\text{℥}$ ij. solv.  $\nabla$ .  $\text{℥}$ ss. solutioni add.  $\nabla$ . fontan.  $\text{℥}$ ij. postea affundatur  $\text{☿}$   $\text{☿}$  p. d. ad præcipitandum  $\text{☿}$  in pulverem rubrum, quem filtratione peracta leviter edulcora, ab  $\nabla$  sepaando.

### *Ratio Processus.*

*Ἐνχειρίδιος* hujus Chymicæ Ætiologiam WILLISIUS hanc dicit, quòd  $\text{☿}$  ab  $\nabla$  Forti dissolvatur, quatenus particulæ salinæ menstrui salibus metalli occurrentes eos sibi statim arripiant, indeque vinculo missionis soluto cæteræ omnes particulæ manumissæ & quaquaversus expansæ inter poros menstrui delitescant, quæ affuso liquore menstruo solventi contrariò facile exinde ad fundum dejiciuntur. Color autem rubicundus hujus præcipitati à proprio  $\text{☿}$  argenti vivi oritur, quod per solut. cum  $\text{☿}$   $\text{☿}$  vel  $\nabla$ . magis extrahitur, cum  $\text{☿}$   $\text{☿}$ . admodum sulphureus texturam ejus citius feriat & penetret.

### VI.

#### *Mercurius præcipitatus luteus.*

$\text{☿}$ .  $\text{☿}$  sublimat.  $\text{℥}$ ij. solvatur in  $\nabla$  fontan.  $\text{℥}$ ijj. affund.  $\nabla$ .  $\text{℥}$ . aut  $\text{☿}$   $\text{☿}$  p. d. Filtra, ad separandum pulverem luteum, edulcorandum.

### *Ratio Processus*

Eadem est, quæ in prioribus, nisi quod color luteus à particulis sulphureis  $\text{☿}$ rii in minori quantitate extrahitur.

### VII.

#### *Mercurius præcipitatus viridis.*

$\text{☿}$ .  $\text{☿}$  pulv.  $\text{℥}$ ss. solv. in matrac. exig. cum  $\nabla$  Forti  $\text{℥}$ ijj. admove calorem lenem, ut facilius solvatur, tum recipe  $\text{☿}$   $\text{☿}$  &  $\ominus$  com. albiss. ana  $\text{℥}$ ii. solv. in  $\nabla$  Fontan.  $\text{℥}$ vj. ambas solutiones misce & affunde guttatim  $\text{☿}$   $\text{☿}$ . q. f. ad præcipitandum  $\text{☿}$ , tum solutiones leviter evapora, & obtinebis pulverem præstantissimum.

### *Ætiologia*

Coloris viridis, ob  $\text{☿}$  admistam, cuius patefcere poterit: de reliquis par parium est ratio.

### *Ufus*

Omniùm Præcipitatorum magis externus, quàm internus est, in curandis affectibus cutaneis, uceribus sordidis antiquis, è quibus carnem putridam, aut sola, aut c. O. usto absument. Quid in curanda Lue  $\text{☿}$  faciant, lippis & tonsoribus etiam notum est.

### VIII.

#### *Bezoardicum Maximum Fabri.*

$\text{☿}$ . Stanni  $\text{℥}$ ijj. Funde in crucibulo: liquato stanno adde  $\text{☿}$  vivi pondus æquale, tum citò crucibulum exime igne & materiam fusam in pavementum, probè prius à sordibus mundatum & siccum, effunde, & refrigerabitur. Tum  $\text{☿}$ . hoc amalgama atque pulverisa, adde  $\text{☿}$  sublimati  $\text{℥}$ vj. & inde retortæ cui adapta recipiens, in quod  $\nabla$  Fontan.  $\text{℥}$ ijj. infuderis. Destilla postmodum prodibitque liquor, *Butyrum Jovis* dictus. Tum deluta recipiens atque retortam, ac capiti mortuo superfunde id, quod in recipiente est & solvetur. Huic solutioni adde  $\text{☿}$ .  $\text{℥}$ ijj. & denuo igne fortissimo destilla & prodibit  $\text{☿}$   $\text{☿}$  *duplicatus*, meritò ita dicendus. Caput mortuum aqua postmodum lavatur & ab eadem mediante filtrò separatur, usuique servatur. Diaphoreticum est omnibus ex  $\text{☿}$  præparatis præferendum, ut ex usibus patefcet.

### *Ratio procedendi.*

Quemadmodum in Butyri  $\text{☿}$  destillatione salia rodebant corpus  $\text{☿}$ , ut exinde primùm  $\text{☿}$  vitæ & abhinc Bezoardicum minerale obtineri possit: ita hoc in processu per salia, in sublimato recondita, Amalgama Jovis similiter in Butyrum Jovis corroditur, è quo postmodum pulvis ille diaphoreticus obtinetur.



Usus

In tollendis obstructionibus (vulgò ita dictis) viscerum inflammationibus, hectica & omnibus pectoris affectibus (in quibus *antihectico* POTERII præstat, est egregius. Datur ad gr. viij. ad x. & plures.

PARTITIO III.

De

SPIRITIBUS CHYMICIS.

I.

*Spiritus salis crocum redolens.*

℞. ☉ marini decrepitati & pulv.

☉ alb. ana. Misce & destilla per Retortam igne vehementissimo, prodibit ☿, & caput mortuum, calcinandum in crucibulo, elixivandum & evaporandum aliquoties, dabit ☉ *mirabile Glauberi.*

*Ratio Processus.*

Quamvis Sal culinare atque fossile spiritum quoque fundant acidum, attamen adeò fragrans non est, quam ☿ ☉ marini. Hic ergò si desideratur, sumendum est ☉ marinum, quod magis sulphureum est. In sale enim marino ☿ vivum, perfectum & inflammabile reperiri testatur anatome ejus Chymica. Decrepitationis ratio autem est, ut prius ☉ tollatur humiditas aquosa, sicut in destillatione ☿ ☉ quoque cum ☉ observatur. Tandem adiicitur ☉ album, pro medio sc. per quod salis particulae mox discontinuari solent, ne, si diutius in igne subsistat, lique scat & fundatur: ad quod alii O. aut argillam, lateres & sim. in bolos formata recipiunt, quæ omnia rejicit BARNERUS ex eò, quòd ☿ quacum terrea hæc in bolos formantur, subdestillatione deinde ☉ decrepitatum nova humiditate imbuat: unde Autor noster alibi in ☿ ☉ communi cotem pulverisatum substituit.

Nec obstat ☉ æque incommodum esse, cum verendum sit ne ☿um suum simul fundat, sicque Spiritus salis ☉ latus (ut SCHROEDERUS eundem vocat) non verò genuinus ☿ ☉ elevetur. Metus enim hic prorsus inanis est, cum ☉ longe fixioris sit naturæ, quàm ut ☉ mistum ☿um suum destillando reddat. Licet ergò ☿ ☉ quodammodo diluat ☿. ☉. nequicquam tamen de ☿ ☉ genuinò simul prodit, adeò quidem, ut si ☿ ☉ rectificatus affundatur ☉ com. hæcque simul destillentur, ☿ ☉ saltim prodeat, teste ETTMULLERO in Comment. ad Pharm. Ludov. pag. 1144. edit. Westphali: ubi simul de variis modis, quibus *Spiritus salis dulcis* redditur, agitur, quos inter optimus est, qui fit cum duplo ☿ eum aliquoties cohobando, quem B. VALENTINUS *aquam suam temperatam* vocat. Interdum tamen cum ☿ quodam appropriato dulcificatur s. mitigatur, sicut in Peste cum ☿ theriacali dulcificatus optimum est præservativum & curativum.

Usus

Spiritus Salis non tantum in Chymicis, sed & in Foro Medico magni semper æstimatus fuit. Illic enim menstruum egregium, ipsum etiam ☉ solvens, præbet. Hic summum est refrigerium in effervescentiis febrilibus, destruendo refranandoque bilem efferatam saliaq; alcalia in corpore humano nimis debacchantia. Hinc in Julepis sitim compescit, tam hypochondriacorum, quam febricitantium. Porro quoque diureticum præbet in hydrope egregium, cum primis si cum ☉ quodam fixo in ☉ salum commutetur. Tandem in confortando tono stomachi ☿ ☉ dulci nihil est præstantius ad provocandum appetitum, cruditatem nidorosam corrigendam, nauseam & vomitum abigendum. Dosis à gr. x. ad xii. imò plures adscendit, in vehiculò appropriatò danda.

II.

*Spiritus ☉ oleum ☉.*

℞. ☉. ad albedinem calcin. q. v.

Pulverisa, & inde Retortæ lutatæ, atque igne reverberii destilla per triduum: prodibit primò ☿ & tandem ☉, ☉ in recipiens. Quod remanet in cucurbita, est ☉ *Cólcothar.*

*Ratio procedendi.*

Quùm ☉ non calcinatum, ob ☿ conjunctum facile collique scens, nullum omnino spiritum fundat, imò etiam Retortam disrumpere faciat, hinc per calcinationem illud primò dephlegmandum erat. Quidam tamen ☿ina ☉ conservando destillationi illud prius committunt, quàm Autor noster ita instituit:

℞. ☉ lib. iij. inde cucurbitæ vitreæ, potie super ignem arenæ, adda præcapitellum & recipiens. ☉ primò solvetur, & postmodum ☿ destillabit in recipiens. Quod remanet in cucurbita, est ☉ *album.*

Utrobique autem non opusest, ut ad partium discontinuationem faciliorem & fluorem coercendum corpus aliud terreum, aut salinum, ut in destillatione ☿ ☉. ☉. ☉. observatur, addamus, cùm ☉ suffi-



ficientes particulas metallico - terrestres in se contineat, quæ impediunt, quò semel calcinatum minus colliquescat. De cæterò ~ & o non nisi gradu majoris vel minus aciditatis differunt, ratione essentia: autem conveniunt, cum o tantum aliquot particulas metallicas secum rapiendo gravius & concentratius sit, ut levi dilutione facile in ~ mutari possit & ~ & vicissim facile in o & (vulgò sic dictum) concentrari possit.

### Usus.

Omnium horum preparatorum è & ferè idem est ac ~ &. nisi quod ~ & majorem adstrictionem & acrimoniam conjunctam habeat, eaque de causâ pulmonibus æquè ac dentibus noceat: unde utrobique ~ & illi substituendus, illi in pleuritide, hîc in dentium nigredine & flavedine tollenda, quamvis præstet hoc in casu ab acidis ejusmodi prorsus abstinere, ne ante congruos annos edentuli fiamus. In ardore febrium & compescenda siti ¶ & cum eò parata Tinctura florum bellidis egregiè conducunt. In stomachi affectibus, aepsia, anorexia & similib. ~ & tribus aut quatuor partibus elix. propriet. aut menthæ misceri poterit, cum primis mitigatus, seu ut loquuntur, *dulcificatus*, cum V. digerendo & cohobando facile parandus: qua ratione & o & dulcificando Spiritum & volatilem suum efficere conatur VIGANUS, hac ratione:

Rx. o & ʒij. affunde V. optimi ʒviii.

hinc calor orietur intensissimus, absque ebullitione. Aptetur excipulum & Δ. lento vel MB. vel ∴ abstrahatur ad dimidias. Hinc refrigerati liquores, tum ille, qui in excipulo est, tum qui in Retortâ remansit, confundantur. Remedium est optimum in omnibus hæmorrhagiis, tam internis, quam externis sistendis, quod aliàs *Aqua Rabelii*, famosi quondam Circumforanei, vocatur.

Si cum ¶ dulcificetur, *Spiritus aperitivus* PENOTI audit, quia D. MICHAELE ita parabatur:

Rx. & calcinati. part. iij.

& ¶. optimè depurati p. j.

Silicum fluviatil. p. vj.

destillantur Δ. fortissimo per Retortam, & prodibit ~ & admodum temperatus, in defectu mensium, malo hypochondriaco & scorbuto cum vehiculo convenienti dandus. Valet etiam in hydrope curando, aliisque obstructionibus viscerum, quas vocant. Dosis est à ʒβ. ad ʒj. E capite mortuo elixiviat c. V. pluviali & *digestivum*, à gr. vj. ad xij. purgantibus pro stimulo adjic. & cum epat. rubr. in dictis modò affectibus propinandum.

### III.

## *Spiritus Salis Armoniaci volatilis, omnibus hætenus cognitis penetrantior.*

Rx. & \*

lapid. hæmatit. ana,

contunde separatim in mortariò marmoreò: Misce & per spatium 14. præterpropter dierum in cella repone. Postmodum inde Retortæ vitreæ, atque in ∴ destilla igne primùm lentò & prodibit ¶. Postmodum adapteretur vas recipiens & igne ad 4. gradum aucto egredietur ~ admodum penetrans, qui eximendus & usui servandus. Abhinc caput mortuum, in Retortâ residuum, fractâ hæc eximitur & pulverisatum in cellâ reponitur, donec liquefeat: Tum ex eò, mediante igne suppressionis, elicitur Spiritus Salis. In qua tamen operatione attendendum, ne ~ & \*, qui adhuc in capite mortuo restat, cum ~ & misceatur. Proinde primò prodiens gustu explorandus est, nec recipiens prius lutari debet, quàm ~ &. percipiamus. Ultima hæc operatio multoties potest iterari & semper ~ & elici. Hic ~ & cum ~ & \* æquali pondere mixtus dat *Tincturam cælestem*, mixturam ad omnia stomachi vitia convenientem & omnibus stomachicis palmam præripientem. Si ex capite mortuo novum ~ & destillare animus sit, adde ad quamlibet ejus libram & \* lbβ. atque iterum, ut ab initio, proceditur. Hic processus potest continuari in infinitum ferè, & post multas operationes, si lubet, caput mortuum in crucibulo igni expono, & exinde paro *Crocum* & *adstrictivum*.

### *Ratio procedendi.*

Ad genuinam ~ & \* ejusque destillationis ætiologiam explicandam consideranda primùm est & \* nostratis (nam Veterum nativum erat) præparatio, quæ ex &. com. □ & fuligine constat: sub quâ &. vol. urinæ & fuliginis, dum ¶ evaporat, se jungit cum acido &. com. & ambo abeunt in & & sum, seu neutrum, quod vocatur Sal armoniacum. Quod si jam sali huic nil nisi lapidem hæmatitem cum Autore, aut limaturam ¶ cum ZWELFERO addamus, primò quidem ~ quodammodò alcalinus seu potius & sus prodit, alter verò, qui sequitur, nil nisi ~ & est, cum hæmatites aut ¶ addita tantum ad discontinuationem particularum & \* faciant: nisi fors dicere velimus per diuturnam illam 14. dierum digestionem texturam magis resolvi, ut &. vol. □. in primâ operatione quodammodo liberetur & elevetur. Unde BARNERUS ~ hunc ad acidos refert. Quod si verò ~ & \* prorsus alcalinum & urinosum desideremus, aliud potius alcali est adjiciendum, quod & commune in & \* sepultum absorbeat atque &. vol. urinæ à compedibus suis liberet. Hunc in finem portio anatica, aut dupla, calcis vivæ illi additur, aut & & ¶ ana, vel si & ¶ nimis pretiosum esse videatur, cinerum clavellatorum portio æqualis, sicque levi candelæ vel carbonum calore Spiritum obtinemus penetrantissimum, hac tamen cum differentia, ut si cum calce viva fiat operatio & \* merum fundat spiritum: Sin cum & ¶ aut cineribus clavellatis, magna ejus pars sub *Florum* & \* formâ se sistat.



Ufus.

Ufus ☿ ☉ \* acidī coincidit cum ☿ ☉ effectibus. Alter, scil. ☿ ☉ \* urinosus, sal volatile mar-  
trum est, omnia fere reliqua volatilia superans. & cum particulis oleosis destitutum sit, in morbis etiam  
calidissimis, ( quos per subitaneum sudorem curat ) innoxium. Diaphoreticum igitur optimum est in  
febris, tam intermittentibus, quam continuis malignis. Illic & tertianam & quartanam curat, unde  
☿ antiquartius D. MICHAELI dicitur. Hic in malignis adeo proficuum est, ut Pesti etiam pestis sit, atte-  
stante ZWELFERO & ipsa experientia. In Pleuritide maligna ☿ hunc admodum profi-  
cium observari. In aliis quoque inflammationibus internè & externè prodest. Urinam valde movet,  
unde Lipsiæ der Sauff Spiritus dicitur, quia ☐ potatoribus movet. Adhæc flatus discutit & nervi-  
nus est, in cardialgia, passione hysterica, Colica & similibus egregius. Menses etiam movet, præmi-  
sis tamen aperientibus fixis, tam internè datus, quam externè per instrumentum GLAUBERI vapore-  
tenus adhibitus. In Scorbuto pariter omnibus palmam dubiam reddit. Dosis à ℥j. ad 3℥.

IV.

*Spiritus Terebinthinæ, & Terebinthina in ☐ solubilis.*

℞. Terebinthin. lib. ij.

☐. Font. lib. v.

☉ ☐. optim. ℥iij.

M. & in Alembico destilla per balneum Mariæ: prodibit unà cum co-  
pioso ☐ ☿ Terebinthinæ optimus, coloris aquei, saporis & odoris grati. Peractâ destillatione ( cuius  
indiciū est, quando nullæ striæ amplius apparent ) à ☐ separatur ope infundibuli. Tum residua  
aqua lactescens decantatur à *Terebinthina cocta*, fundum occupante in Alembico, filtratur ac evaporatur  
ad consistentiam saponis mollis, nomine *Saponis alcalici* veniens. Ex Terebinthinâ cocta autem vul-  
gari modo varii coloris *Olea Terebinthinæ* destillari possunt.

*Ratio procedendi.*

Additur hic alcali, quod retinet crassius & spissius inquinamentum oleosum terebinthinæ, simul-  
que hebetat acidum, ut ☿ volatilis penetrans & efficacissimus prodeat: non secus ac è succino ( cui  
similis est terebinthina ) ☉ vol. simile obtinetur.

Ufus

Ejus in affectibus renū & vesicæ non tantum, sed & pulmonum læsionibus internè est laudatis-  
simus. Externè vi balsamica in vulneribus, cum primis nervorum, neminem deserit. Dos. g. v. ad ℥j.  
in vitello ovi.

PARTITIO IV.

De

TINCTURIS.

I.

*Tinctura & alcalina.*

℞. ☿. crud. pulveris. atque lento igne sensim exsicca, quousque cinereum colorem obtinuerit. Postea  
misce cum æquali pondere ☉ ☐. Misturam funde in crucibulo, atque per spatium 3. horarum in ☐ relin-  
que. Hinc effunde in mortarium marmoreum adipe illitum, ut indurescat. Tum pulverisetur statim ac  
pulveri calenti adhuc affundatur ☐. defæcatissimus, ad eminentiam 3. vel 4. digitorum, matracium pro-  
bè obturetur, sicque ☐. colorem purpureum mox induet.

*Ratio procedendi.*

Ut ☐ & tincturam suam eò facilius impertiat, præmissâ tostione funditur cum ☉ ☐, quod tan-  
quam menstruum sem-universale extractionem ejus juvat. Hinc mirum non est ☐ rectificatissimum ab eo  
statim tingi; quamvis & hujus partes ☐ reæ, ut in Tincturâ ☐, multum ad rubedinem ejus contribuunt.  
Nec obstat dari etiam *Tincturam & cum acido*, quam Autor noster quoque habet & ita parat:

℞. Croci metallor. ℥iij.

Affunde ☿ + penetrantissimum, ad super eminentiam 3. vel 4. digitorum, & post digestionem 3. vel 4.  
dierum evaporetur ad consistentiam extracti. Hinc affunde ☐ defæcatissimum ac digere.

Quod enim ☉ ☐ agit in priori descriptione, hoc ☐ fixum sub detonatione jamdum egerat in cro-  
co metallorum, quod pariter recludit texturam ☐. ejusque ☐ extravertit. Alias enim ☐ per acida se-  
creta non tam per solutionem aut extractionem, sed per solam substantiæ ☐ialis corrosionem fieri  
ETTMULLERUS inde probat, quod ☐, quod à menstruo acido intactum relinquebatur, tali solutio-  
ni partim supernatet, partim ☐ frustulis instar crustæ adhæreat.

Ufus.

Tinctura & alcalina laudatur à Chymicis in curatione morborum chronicorum, obstructionibus



viscerum ab Antiquis adscriptorum, cachexiæ v.g. scabiei contumacioris aliorumque morborum cutaneorum ab humorum circulantium impuritatibus ortorum. Valet quoque plurimum in obstructione menstruorum, sanguinemque purificat. Dosis ejus est à gutt. xij. ad xv. vel xx.

## II.

*Tinctura ☉ sanguinea.*

℞. ☿. fol. ♀. ʒiij.

☉ ☉ optimè exsiccat. ʒij. Pulverisatis affunde ♀. ʒvj. Digere per aliquot dies.

*Ratio procedendi.*

Compositio seu Præparatio hæc coincidit cum *Tinctura ☉*. ☉. ZWELFERI, sub cujus præparatione sæpe evenit, ut conjunctione ☉ ☉ & terræ foliæ ♀ ☉ è ☉ cadat: unde Tincturam hanc magis tartaream, quàm ☉alem dicit ETTMULLERUS. Aliquid tamen de ☉ ☉ accedere saturatissima rubedo inauit, cujus intuitu etiam sanguis ☉ à Geilfusio Sen. Practico quondam Hassiæ famigeratissimo dicebatur: quo titulo adhuc prostat in Officinis Gissenis, Butisbacensibus & Francofurtensibus.

*Usus.*

Fortius deobstruit quàm R ☉, in hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis: cum primis autem in chlorosi & obstructione catameniorum valde utilis. In scorbuto tamen palmam illi dubiam reddit *Tinctura ☉ cœrulea* D. ETTNERI, cujus genuinam descriptionem ab Imperatrice Sorore obtinuit Episcopus Augustanus, ad cujus præparationem requiruntur seqq. 1. Crocus ☉. ℞. Lim. ☉. purif. vel chalybis fere impalpabilis lib. j. ☉. Ungar. optim. ♀. viv. ana lib. iv. immitte omnia in ollam terream & vitream, quibus superfunde + vini albi acerrimum ad eminentiam 4. dig. Pone super Δ. lentum carbonum, & spatulâ lignâ sensim sensimque materiam move, & sic intra horam, vel summè bihorium accipies āāā ☉ale, quod ∇ pura lava, & quando purissimum erit, tunc sicca, colloca in Retortâ in ☉. & Δ suppressionis per gradus evoca ♀. Sic in fundo Retortæ manebit crocus ☉ rubicundissimus, ad colorem ♀ vergens. Hunc crocum tere & pro usu serva. 2. Spiritus ☉ \* cum æquali parte ☉ ♀ l. a. præparatus, qui dein de cap. mortuo proprio evaporatione exsiccat saturatur, usque dum nil amplius de eò imbibat & filtretur. ℞. igitur ☿ ita imprægnati parum, superfunde super crocum ☉ pulverisatum inque vitro agita, & post hæc effunde ☿ sicque repete & crocus cœruleo colore infectus aspicitur. Elue colorem cum ☿ & sic continua, usque dum, quantum illius ad laborem necessarium est, solutus sit, quod ex colore saturato animadvertere pores. Filtra coloratum spiritum & cum altero non colorato conjunge. Demum ad ℔j. hujus adde ʒß. de ☉ ♀ vol. in ☿ ☉ \* ʒij. soluto, sic præparata est *Essentia \* ☉alis*, quam usui serva.

## III.

*Tinctura ☿.*

℞. ☿. ʒj.

☉. ♀. ʒiij.

Liquentur subito in mortario ignito, injecta pulverisentur & in matraccio affundantur ♀. optimi ʒvj.

*Ratio procedendi.*

Cum ☿ commune præter particulas ☉sas balsamicas etiam terrestres & ☿ acidum contineat, hinc ut priores ab his segregentur & seorsim obtineantur, cum menstruo appropriato sulphureo, sc. ♀. extrahendæ erunt, cujus actionem (☿ texturam aperiendo) juvat ☉ ♀ adjectum. Sic particulae ☉sæ solutæ Tincturam suppeditant rubicundam, cum ☉ \* etiam alembicum transeuntem, ut in R ☿ BOYLEI fieri solet.

*Usus.*

Tinctura hæc eadem præstat, quæ Balsamo ☿ tribuuntur, quo gratior longè & gustui acceptior est. Confert igitur in omnibus viscerum internorum, cum primis autem in pulmonum læsionibus, in phthisi, tussi, asthma. Optima quoque est in curandis affectibus cutaneis, scabie & similibus, tam internè propinata, quam externè illita. In curandis fistulis injiciatur eum essentia Myrrhæ aut Elix. proprietatis, sine acido. In ulceribus antiquis & vulneribus pariter cum emolumento adhibetur, cum primis in illis subjectis, quorum cutis ☉sa & emplastra perferre nequit.

## IV.

*Tinctura Myrrhæ.*

℞. ☉ ♀ ʒij.

Myrrh. ʒvj.

♀ rectif. lib. iß. M.

Digerantur leni calore, donec purpureum colorem elegantem spiritus extraxerit. Liquor filtre-

*Ratio*



## Ratio procedendi.

Similia similibus solvuntur. Cum igitur Myrrha subjectum sit resinofum & osum, tale quoque menstruum, sc. V rectif. requirebatur. ☉ ☿ additum juvat & faciliat Arearum particularum extractionem, particulis suis acutis aditum faciendo moleculis osis V. haud aliter ac mechanici, pro meliori clavorum intrusione, terebrando prius aditum parare solent.

## Usus

Tincturæ hujus adeò latè pater, ut D. LANGIO olim *Essentia salutis* dicta fuerit. Quid quod ab HELMONTIO ipsa myrrha pro corporis humani balsamo & vitæ confortativo habeatur; quò etiam respexisse videntur Magi ex Oriente venientes, & Salvatori thus, aurum & myrrham offerentes. Vi enim suâ balsamica resistit omni putredini: unde loco præservativi contra Pestem à Paracelso commendata olim fuit Sterzigenfibus. Quemadmodum igitur tempore pestis & aliorum morborum contagiosorum Medicos nunquam ægros visitare jubet ETTMULLERUS, nisi mastichis & myrrhæ masticatione prius se muniverint: ita pariter essentia & tinctura myrrhæ hunc in finem aliis præservativi loco præscribi poterit: quam ipso, quo hæc scribo, annò, febre petechiali Gissæ, (quo milites præsidarii in ultima Landavii obsidione capti, per Galliam ducti & durissimè habiti, tandem in Hassiam remissi eandem deportaverant) grassante & metum pestis inducente, arcani nomine venditando Practicus quidam, non sine scœnore insigni, per schedulas publicas commendabat. Adhæc egregium expulsum est in variolis & morbillis, catameniis & lochiis obstructis, unde & foetum demortuum potentissimè expellit. Pro sanguine scorbutico depurgando seq. ratione eandem præscribit ETTMULLERUS:

℞. R. ♂. è scor. ʒij.

Myrrhæ ʒj. M.

Dentur 30. vel 40. guttæ in vehiculo domestico aut appropriato.

In scabie idem

℞. R. aut essent. Myrrh. ʒij.

lignor. comp. ʒiij.

M. D. ad 40. guttas.

In stomacho aliisque visceribus roborandis & à verminosa putredine præservandis pariter valdè prodest, eamque ob causam Elixir proprietatis PARACELSI ingreditur.

Externè laudatur in vulneribus & ulceribus antiquis, cum primis fistulosis, ope siphonis injecta. Quin & in scorbuto oris vel sola, vel cum R. ligni sancti, aut, si hæmorrhagia gingivarum insignior conjungitur, cum R. Laccæ maritata.

## V.

### Tinctura ☿ extemporanea.

Hanc ante V & quod excurrit lustra in Laboratorio Regio ita parari vidi: Calcinaverant sc. & in Δ. detinuerant ☉ ☿ per triduum: huic adhuc calido & ferventi infundebant V. qui statim & in continenti colore rubicundo tingebatur.

## Ratio procedendi.

Cum Tinctura hæc, ut alibi dictum fuit, potius osis V. particulis quàm ☉ ☿ tribuenda sit, hinc mirum non est easdem à ☉ ☿ per diuturnam & continuam hanc calcinationem & calorem actualem summè activo reddito & q̄. volatilifato statim resolvi, suamque Tincturam subito de se spargere: haud aliter ac salia volatilia cum os digesta rubedinem induunt.

## Usus.

Tinctura ☿ egregium medicamentum in obstructionibus Viscerum antiquis, malo hypochondriaco, alvo contumaciori, calculo & mensibus pellendis constituit. HARTMANNUS eandem tempore somni assumendam suadet: ast & tempore matutino & vesperi, aliisque horis Medicis sumi potest, & quidem à gutt. xx. ad xxx. in cerevisia, aut vino calido, vel aliis vehiculis.

Potest misceri cum aliis appropriatis, sive nephriticis, v.g.

℞. Tinct. ☿.

Essent. ♂. ana ʒij. M. D. gutt. xxx. ad xxx. in vehic. conven.

Vel

℞. Tinct. ☿.

♂. āā. ʒj.

Liq. nephrit. ex filic. Glaub. ʒij.

M. D. gutt. xxx. in ▽. saxifrag.

## VI.

### Aqua styptica. A.

℞. ☉ albi ʒij. dissolv. in

▽. calid. ℥bj. Postmodum ℞.

O. rubri ʒij. dissolve itid. in

▽. calid. ℥bj. Solutiones misce ac trajice per chartam: Post-

modum evaporentur ad dimidium: adde paululum solutionis heliotropii tricocci, ad conciliandam Tincturam purpuream.



## PARTITIO V.

De

## SALIBUS QUIBUSDAM CHYMICIS.

## I.

*Tartarus solubilis.*℞.  $\square$ . crud. pulverif. ℥j.

$\ominus$   $\square$  ℥ss. M. ac solve in Fontan. pint. V. solutionem calefac in sartagine, cavendo, ne liquor, qui in spumam abit, extra sartaginem emergat. Tandem trajiciatur per filtrum & evaporetur.

*Ratio Processus.*

Cum  $\square$  ejusque cremor & crystalli non nisi in vehiculo calido solvantur, haud pauci verò eundem in vino aut cerevisia assumere ament, hinc illi combinatur sal  $\square$ , quod faciliè solvitur in quovis humido. Ubi tamen observandum est, ut statim sub ipsa solutione, dum adhuc quodammodo ebullit, absorbeatur, cum  $\square$  depuratus faciliè connubium  $\ominus$   $\square$  deserat & fundum petat.

*Usus*

$\square$  solubilis est egregius pro digestivo & laxativo in hypochondriacis, quibus cremor & crystalli  $\square$  aciditate sua tormina sæpe movent, quæ in  $\square$  solubili corrigitur per  $\ominus$   $\square$  alcalinum. Abstergit egregiè pituitam, ventriculum & intestina obsidenrent, & blandâ irritatione alvum laxat. Unde in curâ acidularum, si forte alvus contumacior reddatur, salutaris ejusdem usus est, cum operationem acidularum per secessum juvet. Datur à ℥j. ad 3℥. in poculo vini.

## II.

*Tartarus Olatus.*℞. Spirit.  $\ominus$ .

$\circ\circ$   $\square$ . p. d. ana. M. & cessante ebullitione affunde  $\nabla$ . calid. q. s. evapora ad medietatem & repone, ut concrevant crystalli, quos exime, iterum evapora, idque toties repete, donec omnem  $\square$  Olatum exemeris.

*Ratio procedendi.*

Cum  $\sim$   $\ominus$  nimium acidus & corrosivus sit, hinc per additionem  $\circ\circ$   $\square$  per deliq. tanquam  $\ominus$  alcali contrarii cicurandus erat; adeoque duo hæc proportionem anaticâ maritata sal tertium, quod neutrum & enixum vocant alii, exsurgit, & de utroque participando mediam, falsam & abstergentem qualitatem nanciscitur.

*Usus.*

Tartarum hunc Olatum laudatus sæpius ET TMULLERUS in Comment. Schroed. elegans & universale digestivum ante purgationem pro affectibus ventriculi & intestinorum vocat, ut & aperitivum primarum viarum. Sapore enim suo falso & vi non nihil laxativa & diuretica insigniter abstergit & temperat; hinc in morbis chronicis remedium merito laudandum est. Observat idem, quod si  $\square$   $\ominus$ . à ℥i. ad 3℥ purgantibus misceatur, dimidia saltem horum dosis sit sumenda, quoniam  $\square$  per se habet vim proritandi alvum & stimulandi intestina ad excretionem.

## III.

*fixum.*℞.  $\ominus$ 

$\square$  ana. Pulverif. & M. Hæc materia per vices injiciatur in crucibulum candens & deflagratione finitâ remanebit sal, quod neutrquam deflagrabit in prunas injectum.

*Ratio procedendi.*

Cum  $\ominus$  nihil aliud sit quam  $\ominus$  compositum ex  $\ominus$  alcali & spiritu acido sulphureo, hinc, si alcali ex illo desideremus, spiritus acidus ex eo abigendus est, sive per accensionem cum carbonibus, sive per detonationem cum aliis subjectis  $\triangle$ reis: unde post croci metallorum &  $\delta$  diaphoretici præparationem illud gratis obtinemus. Ut verò omnes  $\sim$  acidi particulæ, si quæ post accensionem remaneant, penitus enerventur, non sine causâ Autor noster adjecit  $\square$ , sub calcinatione  $\ominus$  suum fixum pariter suppeditanem & acidum illud magis corrigenstem.

*Usus*



## Usus

Hujus  $\ominus$ . Chymicis admodum proficius & expetitus est ad plures solutiones instituendas, adeo quidem, ut GLAUBERUS liquorem exinde per deliquium paratum pro decantato *liquore Alkehest* venditare non dubitaverit.

## IV.

### *Arcanum Duplicatum.*

Hoc nihil aliud est quam  $\ominus$  extractum è capite mortuo aquæ fortis. Est sc. Sal neutrum, ex parte fixiore  $\oplus$  &  $\ominus$ . Pro hac operatione caput mortuum minutissimè pulverisatur, solvitur in  $\nabla$ . filtratur & evaporatur in sartagine ferreâ, remanetque Sal fixum, quod vocatur  $\ominus$  ex duobus, *Arcanum duplicatum* Mynsichti & *Panacea Holsatica*. Aliter autem à D. LUDOVICO paratur ita:

Rx.  $\oplus$ . lib. j. Solvatur in

$\nabla$ . calid. lib. iij. Solutio filtretur, & infundatur

$\oplus$  fixi in aq. font.  $\zeta$ viiij. solut. & præcipitabitur terra  $\ominus$ . Hinc liquor per chartam filtrandus est, ut remaneat terra, quæ exsiccanda. Postmodum liquor evaporetur, & remanebit  $\ominus$ . arcanum duplicatum dictum, quod in crucibulo reverberandum.

### *Ratio Processus.*

In utraque operatione Sal fixum  $\oplus$  arripit acidum  $\ominus$ . sicque trahit metallum, simul tamen partem  $\ominus$  metallicam aggrediens & aliquid de  $\triangle$  ejus fixo & anodyno arripiens tandem in  $\ominus$  salsum seu enixum abit.

## Usus

Intuitu non tantum convenit cum aliorum salium mediorum qualitate abstersiva & diuretica, sed &  $\triangle$  intuitu vim possidet anodynam & somniferam in vigiliis diuturnis aliisque affectibus. Hinc optimum est remedium in affectibus chronicis, malo hypoch. scorbuto, febribus intermittentibus & continuis lentis omnibusque lymphæ per vasa & renes abundantis; it. in suppressione mensium, deliriis melanchol. & mania. Dos.  $\mathfrak{z}$ j.

## PARTITIO VI.

De

## MAGISTERIIS.

### I.

#### *Lac Sulphuris.*

Rx.  $\triangle$  subtilissimè triti,

$\ominus$   $\nabla$  ana.

Liquentur in vase fictili vitreato, hinc coq. in  $\nabla$ . font. Hanc  $\nabla$ . filtra per chartam & instilla acetum, sic præcipitabitur ad fundum pulv. albicans, Lac  $\triangle$ . dictus.

### *Ratio procedendi.*

Contraria contrariis præcipitantur: quæ Regula in Magisteriorum præparatione potissimum observanda est. Cum igitur  $\ominus$   $\nabla$  sub coctione roserit sibi que junxerit  $\triangle$  particulas, hinc illi, ceu alcalino subjecto, menstruum seu potius præcipitans contrarium, sc. acidum, opponendum erat, quod  $\ominus$   $\nabla$  devorando particulas  $\triangle$  à compedibus liberat & separat, quæ sua gravitate fundum petunt. Colorem autem albicantem harum particularum BARNERUS à duplici causâ derivat, primò à salibus, & 2. ab aère; adeoque Lac vocatur Magisterium, non ratione consistentiæ, sed ratione coloris, quod in inscriptione formularum observandum, ne cum ineptis Candidatis illud pro liquore habeamus.

## Usus.

Decantatum est in plurimis affectibus pectoris, tussi, asthmate, phthisi, scabie item & affectibus cutaneis internè & externè. Ast licet non omni virtute balsamica destitutum, & ita non omnino pro calce inerte habendum sit, certum tamen est, quod virtus illa maximè castrata sit, adeo ut  $\zeta$ j. florum  $\triangle$  aut  $\triangle$  com. purioris plus agat, quam  $\zeta$ j. Magisterii.

Hinc ETTMULLERUS alium, eumque convenientiorem, habet modum Lac  $\triangle$  absque acido parandi, quando balsamum  $\triangle$  ad extracti consistentiam inspissatum extrahit cum  $\nabla$ . rectificato & abhinc præcipitat cum  $\nabla$  simplici. Convenit non tantum in Phthisi, sed & in Peste rotulis præservativis misceri potest. Externè Varos curat & cosmeticum est.



## II.

*Resina Jalappæ & Scammonei.*

℞. Jalapp. aut Scammon. contrit. q. plac. affunde V. rectific. q. s. & extrahetur Resina. Solutioni filtratæ affundatur ∇. com. & Resina fundum petet. Spiritum vini igne lento in Alembico vitreo denuò abstrahere poteris. Postmodum Resina exempta aliquoties lavatur aquâ, priorem rejiciendo & novam affundendo. Denique exsiccat & usui servatur. Eodem modo proceditur in aliis Resinis parandis.

*Ratio procedendi.*

Quum Resina horum subjectorum sit naturæ osæ, hinc per simile menstruum, sc. V. rectificatum extrahenda erat; & cum os nihil magis sit contrarium quam aqua communis, quæ illi misceri nequit, hinc per hujus affusionem pori in menstruo ampliores redditæ solutum amplius continere nequeunt, sed ad fundum secedere permittunt; quod facile in majori copia obtinetur, si Resina in radice jalappæ quodammodo extraversa sit, & splendore se prædat.

*Usus*

Horum Magisteriorum idem est qui simplicium, hæc tamen cum distinctione, quod Resina Jalappæ in minore quantitate & fortius, quàm mixtum integrum: Resina Scammonii autem mitius & debilius, quàm mixtum integrum, sub eadem dosi, agant. Quod enim Rad. Jalappæ ℥j. efficit, hoc Resin. Jalappæ ℥ss. præstare valet, quæ communis ejus dosi est. Aliter autem res se habet cum Scammonio, quod in substantia vix ultra grana quædam tuto datur, cum tamen Resinæ duplum propinari possit. Rationem in Sal, particulis sulphureis combinatum, rejicit WILLISIUS, quod sub extractione Scammonii maximam ad partem evasisse, in solutione verò Jalappæ permansisse dicit; unde & Resinæ hæ saponem acriorem habentes fortius operari & purgare solent. Conveniunt autem ad eliminandum serum & aquas hydropicorum aliisque in affectibus, à colluvie serosa oriundis.

## III.

*Magisteria Testaceorum.*

℞. Testarum Ostrearum bene lotarum, & in mortar. contus. q. v. & in vase vitreo vel figulino superaffunde ~ Phil. Philosophicum, vel acetum destillatum: Repone in digestionem per biduum vel triduum, donec menstruum particulis solutis probè fuerit imprægnatum, cujus signum est, quando affuso os ♀. per deliq. solutio lactescit: Tum solutionem filtra & affunde os ♀. p. d. vel ~ ☉ \*. & Magisterium testaceum ad fundum præcipitabitur, à liquore ope decantationis separandum.

*Ratio procedendi.*

Cum corpora ejusmodi testacea ad extractionem propriè sic dictam sint inepta: hinc ~ Phil. aut \* illis affunditur, ut saltem rodant & abradant quasdam illarum particulas. Quamprimùm autem liquor menstruo contrarius, os ♀. aut ~ ☉ \* affunditur, oritur effervescentia atque lucta inter utrumque, sub cujus motu pori solventis majorem nanciscuntur diametrum, adeò, ut particule testaceorum abrasæ illis excidant, & ad fundum secedant.

*Usus*

Horum Magisteriorum nullus aut perquam exiguus est. Cùm enim omnia ejusmodi marina & testacea potissimum acidum absorbendo agant, hinc acido extra corpus humanum imbuta, &, ut loquuntur, saturata, acidum parile in corpore humano oberrans non amplius attingunt. Præstat ergo simplicibus & integris adhuc uti, quàm castratis.

Nec obstat ratio Salis, à menstruo illis adhærentis, istis vim quandam saponariam, abstersivam aut deobstruentem competere:

℞. Habemus enim alia deterfiva magis tuta, cùm salia à menstruis his quodammodò corrosiva sint; & quia nulla arte omninò possunt elui, hinc mirum non est, quod post usum Magisteriorum illorum, etiam pretiosorum, sc. perlarum & coralliorum, ventriculus quandoque corrosus inventus fuerit.



# TABULA LOCUM ET TEMPUS, QVIBUS UBERIUS PLANTÆ, POTISSIMUM SPONTANÆ, VIGENT AC PROVENIUNT, EXPRIMENS.

JANUAR.	FEBRUARIUS.	MARTIUS.	APRILIS.	MAJUS.	JUNIUS.	JULIUS.	AUGUSTUS.	SEPTEMBR.
<p><i>Tussilago</i> Petalites, * fl. rubro major, minor fl. al- bo. Saxifraga aurea Do- donzi. Lencojum bulbosum Theophrasti, * five Narcisso-leucojum.</p>	<p><i>Viola</i> Bellis minor. Vicia spina sativa. Cornus fl. Chamaecissus Hyacinthus &amp; quidem Botryoi- des cœruleus. Viola purpurea alba &amp; incarna- ta simplex. Amygdal. fl. Armeniacæ fl. Viola latifolia fl. purpureo. Dalechamp. seu Bulbonac. *</p>	<p><i>Alnus</i> Myrica Caltha Palustris. * Tithymallus palustris frutico- sus C. Bauhin. * Tufolium palustre ( maxime si hyems præcedens mitior.) * Colchicum, quod sapius hye- me tepidiore præcessit, tempore verno florescens offenditur, quod &amp; Gefnerus, Clusius &amp; alii anno- tarunt.</p>	<p><i>Pseudoacorus</i> Oxylapathum Hippolapathum * Ranunculus fluvialis Taber- n. Plantago aquatica. Nymphaea alba &amp; lutea Quinquefolium palustre Sambucus aquatica * Alnus foetida seu frangula * Anagallis aquatica foliis ro- tundis major &amp; minor, item fo- liis oblongis major &amp; minor. * Viola aquatilis altera Dodon.</p>	<p><i>Chamaecissus</i> Acerofa Orobanchæ, Dentaria. OphioGLOSSUM Orchis &amp; hujus aliquot species. Palma Christi. Satyrion. Betonica. Caryophyllata. Gramen vulgare lob. * Gramen perenne miliaceum Cam. Gramen Matthioli vulgare ( in prima illa editione ) putatum.</p>	<p><i>Spica</i> Lavendula, Thymum. Ruta, Rosa, Olea, Foeniculum. Pisum, Melanthium, Malva. Lolium, Atriplex, ejus multæ species sunt. Melissa, Lili- um, Cruentum, Spinachia, Portu- laca, Horminum sativum, Scla- rea, Althæa, Endivia, Coronopus, Tomentilla, Cichorium sativum, Viola Mariana, Nastur- tium, * Nasturt. crispum, Piperi- tis, Lepidium, Gentiana, ste- chas, Labrum Veneris. * Ane- thum, Absinthium Ponticum, Sanguisorba major. * Papaver sativum corniculatum. * Pœonia fl. plên. * Coluthea, f. Orpoides.</p>	<p><i>Phu Germanicum</i> Fuchs. Scrophularia. * foemina Cam. Corona Solis. Helenium Hydriopiper * Persicaria maculosa Pulegium, Eleoselinum Calamintha aquatica * Potamogeton latifolium, angustifo- lium, &amp; reliquæ species. * Cicuta aquatica, * Bârgenfraut. Gefn. Acyrum, Nummularia Herba Kunigundis. Potentilla, Equi- setum palustre longioribus setis. Item brevioribus setis. *</p>	<p><i>Sifymbrium</i> Mentha species, Botrys, * quod alias clivis apri- cis gaudet. Spharula foetida, Halicacabus, Tribulus aquaticus fl. * Gratiola. * Anagallis aquatica angustifo- lia minima C. Bauh. * Allium fol. narcissinis majus &amp; minus Clusii * Arundo</p>	<p><i>Typha</i> florens * Gramen Calamagrostis fl. * Millefolium cornutum aqua- cum spicatum C. Bauhin. fl. * Millefol. pennatum aqua- cum spicatum C. Bauhin. fl. * Hyssopides Thalii, quod hi- midioribus avorum scrobibus frequens.</p>
<p><i>Elleborus</i> niger, * fl. herbaceo. Elleborus niger fl. al- bo. *</p>	<p><i>Buxus</i> Pseudoelleborus * qui in Thuringia clivis &amp; collibus, ac juxta vias quando- que abundat. Leucojum bulbo- sum * quod alias sylvis gaudet. Narcissus luteus præcox. * Aconitum hyeme- le. * Crocus vernus varius florum colo- ribus. Corylus sativa fl.</p>	<p><i>Vicia</i> spina sativa. Cornus fl. Chamaecissus Hyacinthus &amp; quidem Botryoi- des cœruleus. Viola purpurea alba &amp; incarna- ta simplex. Amygdal. fl. Armeniacæ fl. Viola latifolia fl. purpureo. Dalechamp. seu Bulbonac. *</p>	<p><i>Ribes</i> * minus &amp; majus quoad fructum. Castanea fl. Cerafa fl. Persica fl. Pyrus fl. Juglans fl. Bellis sativa variis fl. colorib. Ranunculus nemorosus fl. pleno Clusio depictus. Asparagi Cymæ ad delicias men- sarum carpuntur. *</p>	<p><i>Iris</i>. Et quidem varietate colo- rum placcus. * Chamaecissus alba, purpureo, violacea repens. Tilia. Staphylocladon fl. Por- rum. Berberis. Raphanus rusticus. Ce- refolium. Malus fl. Rhamna- chorum. Alphonelus. Fumaria. Fumaria Hispanica. * Myrrhis. Caltha. Aquilegia. Rosmarinus. Cheiri seu Leucojum Lupini * qui alias julio vigere &amp; florescens solent. Pœonia mas &amp; foemina. Coluthea nempe Scorpioides i. Clusii, non illa vulgaris. Fraxinella, * quæ Thuringiæ col- libus &amp; sylvis quibusdam fami- liaris est.</p>	<p><i>Spica</i> Lavendula, Thymum. Ruta, Rosa, Olea, Foeniculum. Pisum, Melanthium, Malva. Lolium, Atriplex, ejus multæ species sunt. Melissa, Lili- um, Cruentum, Spinachia, Portu- laca, Horminum sativum, Scla- rea, Althæa, Endivia, Coronopus, Tomentilla, Cichorium sativum, Viola Mariana, Nastur- tium, * Nasturt. crispum, Piperi- tis, Lepidium, Gentiana, ste- chas, Labrum Veneris. * Ane- thum, Absinthium Ponticum, Sanguisorba major. * Papaver sativum corniculatum. * Pœonia fl. plên. * Coluthea, f. Orpoides.</p>	<p><i>Cyperus</i>. Fœnum græcum. Phaeoli. Blitum Ungaricum. Beta alba, nigra. Asparagus altiss. Cucurbita, Pyra. Cucumis melones. Lactuca, Sifaram. Eruca. Ocimum Basilic. Cœps. Allium sativum. Sinapi. Piper Indicum. Caryophyllus fl. Glycyrrhiza. Artichochi.</p>	<p><i>Fruentum</i> Turcicum, five In- dicum, seu Bactrianum. Brafica, Menta crispa. Abrotanum fl. Abrotanum camphorat. fl. * Ammi. Mentastum, Majorana. Angelica. Cucumis Asininus. Ricinus. Lactris. * Digitalis rubra. Monardica. Cn. cus. Poma frugif. Poma Veneris fl. Lilium album. Tanacetum Angl. fl.</p>	<p><i>Crocus</i> fl. Cyclaminus fl. * Calamentum montanum præstantius. * Linaria elatior Pannon. carul. * Alcea Cannabina fruticans. * Coflus hortensis. * Mala Infana. * Ponia Aethiopica. * Melissa Molucca. * Solanum tuberosum. * Convolvulus cœruleus. * Narcissus Autumnalis. * Anemone 3 Matthioli in hor- tis reflorescens.</p>
<p><i>Avellana</i> sylvestr. fl. * Alnus fl. * Populus Lybica seu Tremula fl.</p>	<p><i>Vicum</i>. Trinitas, squammaria. Alfine, * vulgarior &amp; illa, quæ foliis hederaceis est. * Moschatella Cordi. * Bulbus sylvestris Cordi. * Fumaria bulbosa. Pseudofu- maria. * Radix non cava. * Tithymallus sylvaticus verno tempore recens.</p>	<p><i>Vicum</i>. Trinitas, squammaria. Alfine, * vulgarior &amp; illa, quæ foliis hederaceis est. * Moschatella Cordi. * Bulbus sylvestris Cordi. * Fumaria bulbosa. Pseudofu- maria. * Radix non cava. * Tithymallus sylvaticus verno tempore recens.</p>	<p><i>Asarum</i>. Betula. Ribes nigra, Quercus. Fagus, Castanea, Pyrus sylve- stris fl. Alleluja. Fragaria fl. * Orob. vernus sylvaticus Thali. * Ranunculus nemorosus albus purpureus.</p>	<p><i>Myrtillus</i>. Lilium convallium. Rubus. Herba Paris. Fungi, Tubera. Ophrys. * Astragalus sylvaticus Thalii. * Cerafus avium nemoros. fl. * Ranunculus sylvaticus hirsu- tus magnus Platyphyllos.</p>	<p><i>Ligustrum</i>. Pyrola. Sanicula, * mas, foemina. Alchimilla. * Brasica sylvestris Cordi. * Aconitum luteum, Lycoctonon- seotinum. * Securidaca purpurea. * Orchis alvortiva. * Ranunculus secundus Tab. * Ranunculus Alopecuroides. Spica alba Lob.</p>	<p><i>Clematis</i> altera urens. Agrimonia. Smilax lavis * Ebulus, Sambucus, vulg. montana. * Aconitum luteum, Lycoctonon- seotinum. * Lathyrus sylvestris purpureus Do- don. * Lathyrus sylvestris fl. luteis Thalii * Euonymus.</p>	<p><i>Erica</i>. Herden. Succisa. * Filicum genera. * Sonchus sylvaticus &amp; Thalii. * Auricula muris major Tragi. * Polipodium. * Lampiana Lob. * Rhamnus Catharticus baccis onustus est.</p>	<p><i>Hedera</i> provoluta. * Musci species.</p>
<p><i>Avellana</i> domestica fl.</p>	<p><i>Pulsatilla</i> fl.</p>	<p><i>Pulsatilla</i> fl.</p>	<p><i>Persica</i> florens, Amygdalus fl. Confolida media + quæ aliàs pratis &amp; sylvis delectatur. * Saxifraga alba + Chelidionides Lob. * Fumaria. * Lunaria Botrytis. * Holostium Caryophylleum ar- vense Tabern. * Gramen floridum majus Tab. * Chondrilla i. Dios. Columnæ.</p>	<p><i>Eryngium</i>. Geranium + &amp; quidem supinum &amp; pes columbinus. Pilosella. Saxifraga alba + Chelidionides Lob. * Fumaria. * Lunaria Botrytis. * Holostium Caryophylleum ar- vense Tabern. * Gramen floridum majus Tab. * Chondrilla i. Dios. Columnæ.</p>	<p><i>Atriplex</i>, Perfoliata + quæ sub- inde agros amat, ut in agris Al- torphanis videre est. Portulaca sylvestris Absinthium vulgare + quod in quibusd. pagis Halia frequens. Veronica + quæ sylvis aridiori- bus delectatur. * Veronica spicata minor. Foeniculum, Ruta, Daucus. Chamaecypis. Vrtica. * Chondrilla Coronopifolia.</p>	<p><i>Telephium</i>. Origanum, Dostgen. Calamintha, Satureja. Serpillium Melilotus coronata. Artemisia, + rubro &amp; viridante caule. Gnaphalium, + medium &amp; minus. Tanacetum. Hypericum + vulgare. * Hypericum supinum tertium Clu- sii. * Serracavallo Germanicum Cam- mer. Peplus. +</p>	<p><i>Erica</i>. Abrotanum + foemina, in qui- busdam regionibus spontaneum nobis tantum hortense. Serpillium alterum. Serpillium angustifolium inodo- rum. + Virga aurea. Cucumer asininus. Mercurialis + Mas &amp; foemina. * Trifolium acutum album. * Colli lutei Thalii i. minor * species.</p>	<p><i>Carlina</i> seu Carduus sylvestris Camer.</p>
<p><i>Paronychia</i> alfine folia Lob.</p>	<p><i>Alfine</i> verna glabra Lugd. Vva spina sylvestr. Prunus sylvestr. Burfa pastoris. Chamaecissus. Senecio. Radix cava &amp; radix non cava + quæ aliàs dumeris juxta vias abundat. + Alfine minor.</p>	<p><i>Alfine</i> verna glabra Lugd. Vva spina sylvestr. Prunus sylvestr. Burfa pastoris. Chamaecissus. Senecio. Radix cava &amp; radix non cava + quæ aliàs dumeris juxta vias abundat. + Alfine minor.</p>	<p><i>Mespilus</i> fl. Fragaria fl. Adiantum five Paronychia Matth. Vrtica inortua. * Vrtica non mordax vulgaris foetens purpurea Lob. * Spergula saginæ quæ etiam a- gros amat. * Cauda muris.</p>	<p><i>Acuta</i> spina. Berberis. Plantago major, media, minor. Thlaspi + vulgarissimum vacca- rie folio, Lob. Rubia sylvestris. Caryophyllata. Rubus fructu cæruleo humilior. * Rubus fructu nigro grandis. * Aizoon acre minimum. * Sedum five Aizoon inspidum minimum. * Aizoon teretifolium album Lob. * Aparine lavis &amp; aspera.</p>	<p><i>Ligustrum</i> + Thlaspidium Virga sanguinea. Atriplex. Coronopus. Chelidonium majus. Labrum Veneris alterum. Carduus Marianus. Absinthium vulgare. Ballote vulg. alb. Ballote nigra. + Ballote crispa Lugd. Alliaria, Periclymenon, Lichen, Hepatica font. Hyoscyamus Sempervivum majus &amp; minus, Sambucus, Cuscuta. Bryonia, Glycypteron.</p>	<p><i>Telephium</i>. Cruciata. Calamintha. Apatine. Lithospermum. Lithospermum nigrum. Clematis altera. Clematis urens. Verbena. Cicuta. Parietaria Cardaca Millefolium Gallium Ebulus. Æglops seu Lolium Tragi 2.</p>	<p><i>Vincetoxicum</i>. Halicacabus. * Solanum nigrum. * Solanum vulgare baccis ru- bris * Acanthium * Carduus viarum vulgarior. * Carduus lanceolatus, Tab. * Atriplex olida pusilla hircina Lob. * Atriplex parietum incana. * Convolvulus major * Herniaria.</p>	<p><i>Bonus</i> Henricus. Hedera corymbosa. Caryophyllus sylvestris.</p>
<p><i>Chemelza</i>. Mezere- um. Thymelza fl.</p>	<p><i>Vlmus</i> montana.</p>	<p><i>Vlmus</i> montana.</p>	<p><i>Asarina</i> Prunella Saxifraga hircina. Helleborum album * licet apud nos tantum hortense. Tithymallus. Polygonum brevi angustoque fol. C. Bauh. * Polygonum 3. Tabern. oblon- go angustoque fol.</p>	<p><i>Abies</i>. Juniperus, Aquilegia. Dictamnium album. Martagon seu Hemerocallis. Polygonatum vulgare, Sigil- lum Salomonis. * Polygonatum latifolium. * Polygonatum angustifolium, sed posteriores species tan- tum in montosis sylvis prove- nire solent. Rubus idæus, qui etiam sylvis delectari solet. * * Lagopus, qui &amp; arva sectatur. * Pentaphyllum Petrarum, quod tamen in Junio floret. * Caryophyllus Holostius Lob. * Chamaedrys resupina collina.</p>	<p><i>Prarmica</i>, Thymum. Imperatoria Chamaedrys Stachys. Hemerocallis. Lichen, Hepatica Fontana. Genista. * Genista spinosa. * Polygala recentiorum variis fl. coloribus. Asparagus. * Helianthemum Germanic. Ca- mer. * Stachys Dioscoridis &amp; Plinii Lobel. * Gramen cristatum C. Bauh. Gramen marinum minus Tab. * Synanchica Dalechamp.</p>	<p><i>Meum</i>, Betulus Allium sylvestre. Calamintha montana Smyrnium Artemisia Androsæmum * Ascyrum Aconitum luteum Napellus Anthyllis montana Lugd. * Anthyllis leguminosa Lob. fl. luteo &amp; pallido. * Apium montanum Dalechamp. * After Conyzoides. * After luteus collinus. * Jacea nigra angustifolia, seu Cy- anus sylvestris angustifolius major Thalii. * Jacea alba &amp; secunda Thalii.</p>	<p><i>Peucedanum</i> * quod etiam in quibusdam aridioribus pratis occurrit. Vincetoxicum Atracylis. Cynopodium * majus, minus After Atticus. * Prunella grandiflora. * Ericoides luteum Thalii. * Campanula rotundifolia mi- nima. * Otchis spiralis Gemmæ.</p>	<p><i>Francofurti</i> ad Mœnum, excebat Joh. Philipp. Andreas. 1715.</p>

## LECTORI.

N! accipe, Lector amice, tabulam hanc locum & tempus  
collendarum plantarum experimentem, quondam à celeberrimo  
Medico Theophilo Kennmanno delineatam, jam vero in  
iam Teribilegæ Juventutis in Academia Gießena correctam &  
es adam, quoties hæc signa (\*) (+) (†) occurrunt. Tu tuis  
hoc quicquid est laboris accommoda, & anni tempe-  
stas, respectu quarum jam citius jam serius plantæ pro-  
nuntiant diligenter distingue.







# T A B U L A

## EXCURSIONIBUS BOTANICIS ET CONFICIENDIS HER- BARIIS VIVIS INSERVIENS.

I. INSTRUMENTA	<p>RHIZOTOMUS, ex solido, firmo &amp; indurato chalybe aut ferro, ulnæ unius aut dimidiæ longitudine, cui manubrii loco liguncula adaptetur. Hujus usus eximius est in eruendis radicibus: quem in finem altera extremitas bipartito excurrat, ita ut ab uno latere rutrum sit, quò eruantur plantæ, ab altero ferramentum bicornæ, seu bidens, quo radices illasæ detegi &amp; erui possint.</p> <p>TORCULAR BOTANICUM, à <i>Laurembergio</i> in <i>method. conficiendi herb. viva</i> descriptum: cui &amp; vulgare, quo Bibliopecti utuntur, substitui potest. Hoc plantæ explicatæ complanantur.</p> <p>LIBER ex charta bibula, aut Typographicâ confectus. Compingantur ejus aliquot scapi, in folio, quod dicitur &amp; undique loris &amp; vinculis longioribus instruatur, quorum adminiculo mox constringi, mox relaxari possit.</p>
2. TEMPUS colligendi legitimum	<p>ANNUUM { quod est integer anni cursus, paucissimis mensibus hybernis exceptis. Statim enim circa principium Januarii aliquot Hellebori nigri species, flore viridi cumprimis &amp; rosco, cum ranunculoide, aconito vulgi hyemali, mox &amp; Narcisso-Leucojum, Cornus, Corylus, &amp;c. in flores se induunt: Aliæ autem ad Novembrem usque vigent, <i>vid. Tabula tempus florendi sistens.</i></p> <p>DIURNUM { est pomeridianum, cumprimis mensibus vernalibus: æstate verò summò mane, rore, quo tempore matutino herbæ madescunt, à calore Solis maximam partem disiecto. Eligatur autem tempus serenum, ope barometri explorandum. Humor enim sub tempore pluvioso plantis affricus exsiccationi illarum pestis est truculentissima, quâ tum ad putredinem, tum ad rancorem &amp; nidorem disponuntur. Quodsi autem exinopinatò torrente quodam aut pluvia obruamur, humiditas illa per chartam bibulam à plantis statim absorbenda est, torculari blandè, non violenter, compresso.</p>
Ad HERBARIUM VIVUM conficiendum requi- runtur	<p>3. MODUS exsic- candi plantas</p> <p>hic est: Antequam herbæ in sylvis aliisque locis collectæ sive torculari, sive herbario vivo immittantur, folia superflua, semiputrida &amp; inutilia abscindantur &amp; si caulis aut capitulum justo crassius est, ne commodè agglutinari possit, ab averso latere portio quædam cautè reseccetur. Abhinc in situ naturali planta explicata foliisque ne sibi invicem incumbant, seorsim locatis, inter chartam emporeticam collocentur &amp; torculari botanico fortiter comprimantur. Quampri- mum autem domum redieris, plantæ inde exemptæ novis foliis chartæ bibulæ interponantur, indies hoc repetendo, donec plantæ legitimè exsiccatae sint. Ita enim flores colorem suum nativum retinebunt &amp; ipsa folia à situ &amp; squa-lore immunia erunt.</p>
4. ORDO in dispositione plantarum observandus.	<p>variat admodum. Sunt qui ordinem amant Alphabeticum: Sunt qui plantas ad imitationem <i>Sim. Pauli</i> juxta seriem IV. anni temporum disponunt: Sunt qui characterismos plantarum respiciendo cum <i>Tournefortio</i> &amp; aliis certas plantarum Classes constituunt, è <i>Tab. præcedentibus</i> petendas. Ast optimum hic est consilium <i>DN. SCHELHAMMERI</i>, qui singulis foliis plantas singulas agglutinare jubet, ita ut quævis pagina nonnisi unicam contineat plantam; Sic enim facillimè congeneres sibi jungi, &amp; quandocunque libuerit, series ad imitationem aliorum componi &amp; mutari poterit.</p>
5. GLUTEN Botanicum	<p>SIMPLICIUS, { Ichtyocolla per noctem in V macerata &amp; coq. inspissata. Gummi Arabicum } in V. Vino, aut cerevis. soluta. Tragacanthum } Gluten vulgare Scriptoriorum.</p> <p>MEDICATUM, ad mures &amp; infecta arcenda { <i>Laurembergii</i> { R. Extracti absinth. ʒj. Gummi Arabici ʒß. Cerevis. optim. q. s. M. &amp; factâ solutione reponere pro usu.</p> <p>{ <i>Spigellii</i> { R. Taurocollæ pellucid. ʒj. maceretur in + acerrim. ʒvj. liquef. penes Δ. add. Aloes hepat. ʒß. Pulv. Caryophyll. ʒj. M.</p>



QUESTIONS FOR ANSWERS  
BANKS VIVIS INSE

1521 2119 2119 2119



# INDEX GENERUM PLANTARUM.

## A.

	Pag.	
<i>Abies</i>	19	<i>Asperugo</i>
<i>Adrotanum</i>	12	<i>Asphodelus</i>
<i>Abinthium</i>	ibid.	<i>Asplenium</i>
<i>Abutilon</i>	1	<i>Aster</i>
<i>Acacia</i>	20	<i>Asteriscus</i>
<i>Acanthus</i>	3	<i>Astragaloides</i>
<i>Acer</i>	21	<i>Astragalus</i>
<i>Acerabulum</i>	17	<i>Astrantia</i>
<i>Acerosa</i>	15	<i>Attriplex</i>
<i>Aconitum</i>	11	<i>Avena</i>
<i>Adhatoda</i>	3	<i>Aurantium</i>
<i>Adiantum</i>	16	<i>Auricula nrsi</i>
<i>Agaricus</i>	17	<i>Azedarach</i>
<i>Agrimonia</i>	6	
<i>Agrimonioides</i>	ibid.	<b>B.</b>
<i>Alaternus</i>	20	<i>Ballote</i>
<i>Alcea</i>	1	<i>Balsamina</i>
<i>Alchimilla</i>	15	<i>Barba capra</i>
<i>Alcyonium</i>	17	<i>foris</i>
<i>Alga</i>	ibid.	<i>Belladonna</i>
<i>Alkekengi</i>	2	<i>Bellis</i>
<i>Allium</i>	9	<i>Berberis</i>
<i>Alnus</i>	19	<i>Bermudiana</i>
<i>Alloe</i>	9	<i>Bera</i>
<i>Alfinastrum</i>	6	<i>Betonica</i>
<i>Alfine</i>	ibid.	<i>Betula</i>
<i>Allyssoides</i>	5	<i>Bignonia</i>
<i>Allyson</i>	ib.	<i>Bistorta</i>
<i>Amaranthus</i>	6	<i>Blattaria</i>
<i>Ambrosia</i>	12	<i>Blitum</i>
<i>Ammi</i>	7	<i>Boletus</i>
<i>Amgdalus</i>	21	<i>Borrage</i>
<i>Anacampteros</i>	6	<i>Brassica</i>
<i>Anagallis</i>	2	<i>Brunella</i>
<i>Anagyris</i>	22	<i>Bryonia</i>
<i>Anapodophyllum</i>	6	<i>Buglossum</i>
<i>Anodroface</i>	2	<i>Bugula</i>
<i>Anodrosamum</i>	6	<i>Bulbo-castanum</i>
<i>Anemone</i>	ibid.	<i>Buphtalmum</i>
<i>Anethum</i>	7	<i>Bupleurum</i>
<i>Angelica</i>	ibid.	<i>Bursa pastoris</i>
<i>Aniguria</i>	1	<i>Batomus</i>
<i>Anonis</i>	10	<i>Buxus</i>
<i>Antirrhinum</i>	3	
<i>Asarine</i>	1	<b>C.</b>
<i>Asphaca</i>	10	<i>Acacia</i>
<i>Aspium</i>	7	<i>Cachrys</i>
<i>Aspocynum</i>	1	<i>Calamintha</i>
<i>Asquifolium</i>	20	<i>Calceolus</i>
<i>Asquilegia</i>	11	<i>Caltha</i>
<i>Asralia</i>	6	<i>Campanula</i>
<i>Asbutus</i>	20	<i>Cannabis</i>
<i>Asgemons</i>	6	<i>Cannacorus</i>
<i>Asisarum</i>	3	<i>Capnoides</i>
<i>Aristolochia</i>	ib.	<i>Capparis</i>
<i>Armeniaca</i>	21	<i>Caprifolium</i>
<i>Artemisia</i>	12	<i>Capsicum</i>
<i>Arum</i>	3	<i>Cardamindum</i>
<i>Arundo</i>	15	<i>Cardamine</i>
<i>Asarina</i>	3	<i>Cardiaca</i>
<i>Asarum</i>	15	<i>Carduus</i>
<i>Asclepius</i>	1	<i>Carlina</i>
<i>Ascyrum</i>	6	<i>Carpinus</i>
<i>Asparagus</i>	ibid.	<i>Carthamus</i>
		<i>Carvi</i>
		<i>Caryophyllata</i>
		<i>Caryophyllus</i>

## Pag.

2	<i>Cassia</i>
9	<i>Cassida</i>
ib.	<i>Castanea</i>
14	<i>Catanance</i>
ibid.	<i>Cataria</i>
10	<i>Caucalis</i>
ibid.	<i>Cedrus</i>
7	<i>Celtis</i>
15	<i>Centaurium majus</i>
ibid.	<i>minus</i>
21	<i>Cepa</i>
2	<i>Cerasus</i>
21	<i>Cerinthe</i>
	<i>Charophyllum</i>
4	<i>Chamacerasus</i>
11	<i>Chamadris</i>
6	<i>Chamamelum</i>
22	<i>Chamanerion</i>
1	<i>Chamepytis</i>
14	<i>Chemarodendron</i>
21	<i>Chelidonium</i>
9	<i>Chenopodium</i>
15	<i>Chondrilla</i>
4	<i>Christophoriana</i>
19	<i>Chrysanthemum</i>
3	<i>Chrysosplenium</i>
15	<i>Cicer</i>
2	<i>Cichorium</i>
15	<i>Cicuta</i>
17	<i>Cinara</i>
2	<i>Circea</i>
5	<i>Cirsium</i>
4	<i>Cistus</i>
1	<i>Citreum</i>
2	<i>Clematitis</i>
4	<i>Clinopodium</i>
7	<i>Clymenum</i>
14	<i>Cnicus</i>
7	<i>Cochlearia</i>
5	<i>Colchicum</i>
6	<i>Colocynthis</i>
18	<i>Colutea</i>
	<i>Convolvulus</i>
12	<i>Conyza</i>
7	<i>Corallina</i>
4	<i>Coralloides</i>
11	<i>Corallium</i>
14	<i>Corchorus</i>
1	<i>Coriandrum</i>
15	<i>Corindum</i>
9	<i>Cornus</i>
11	<i>Corona Imperialis</i>
6	<i>Solis</i>
20	<i>Coronilla</i>
2	<i>Coronopus</i>
11	<i>Corylus</i>
5	<i>Cotinus</i>
4	<i>Cotula</i>
12	<i>Coryledon</i>
14	<i>Crambe</i>
19	<i>Crataegus</i>
12	<i>Chirismum</i>
7	<i>Crocus</i>
6	<i>Crotularia</i>
8	<i>Cruciata</i>
	<i>Cucubalus</i>

## Pag.

21	
4	
19	
13	
9	
7	
19	
21	
12	
2	
9	
21	
1	
7	
20	
4	
14	
6	
4	
20	
5	
15	
13	
6	
14	
2	
10	
13	
7	
12	
6	
12	
6	
21	
6	
4	
10	
12	
5	
9	
1	
22	
1	
12	
17	
17	
ibid.	
6	
7	
15	
21	
9	
14	
22	
2	
19	
21	
14	
1	
5	
21	
7	
9	
22	
1	
8	



Cucumis  
Cucurbita  
Cupressus  
Cyanus  
Cyclamen  
Cydonia  
Cynoglossum  
Cyperoides  
Cyperus  
Cytiso-Genista  
Cytisus

## D.

**D** Amasonium  
Daucus  
Delphinium  
Dens canis  
leonis  
Dentaria  
Digitalis  
Dipsacus  
Doronicum  
Dorycnium  
Dracocephalon  
Dracunculus

## E.

**E** Chinopus  
Echinum  
Elichrysium  
Emery  
Empetrum  
Ephemerum  
Epimedium  
Equisetum  
Erica  
Erinacea  
Erugo  
Erucago  
Ervum  
Eryngium  
Erysimum  
Eschava  
Eunonymus  
Eupatorium  
Euphrasia

## F.

**F** Aba  
Fabago  
Fagonia  
Fagopyrum  
Fagus  
Ferrum equinum  
Ferula  
Filago  
Filicula  
Filipendula  
Filix  
Feniculum  
Foenum Graecum  
Fragaria  
Frangula  
Fraxinella  
Fraxinus  
Fritillaria  
Fucus  
Fumaria  
Fungoides  
Fungus

## G.

**G** Alega  
Galeopsis  
Gallium

Pag.  
1 Garidetta  
ibid. Genipa  
19 Genista  
12 Genisto-spartium  
2 Genistella  
2J Gentiana  
2 Geranium  
15 Genu  
ibid. Gladiolus  
22 Glaucium  
ibid. Glaux  
Globularia  
6 Glycyrrhiza  
7 Gnaphalium  
11 Gnaphalodes  
9 Gramen  
13 Granadilla  
5 Grossularia  
3 Guajacana

## H.

**H** Armala  
Hedera  
Hedypnois  
Hedysarum  
Helianthemum  
Heliotropium  
Helleborine  
Helleborus  
Hemionitis  
Herba Paris  
Herniaria  
Hesperis  
Hieracium  
Hippocastanum  
Hordeum  
Horminum  
Hyacinthus  
ibid. Hydrocotyle  
10 Hydrophyllon  
7 Hyosciamus  
5 Hypecoon  
17 Hypericum  
21 Hyssopus

## J.

**J** Acea  
Jacobaea  
Jalapa  
Jasminum  
Ilex  
Imperatoria  
Jonthlasti  
Iris  
Isatis  
Juncago  
Juncus  
Juniperus

## K.

**K** Ali  
Ketmia

## L.

**L** Acryma Jobi  
Lactuca  
Lamium  
Lampsana  
Lapathum  
Lappa  
Larix  
Laserpitium  
10 Lathyrus  
4 Lavandula  
1 Laurocerasus

Pag.  
22 Laurus  
ibid. Lens  
ibid. Lentiscus  
ibid. Leonurus  
ibid. Lepidium  
22 Leucanthemum  
1 Lencojum  
6 Lichen  
ibid. Ligusticum  
9 Ligustrum  
6 Lilac  
1 Lilio-Aphodelus  
12 Liliastrum  
10 Lilio-hyacinthus  
12 Lilio-Narcissus  
ibid. Lilium  
15 Lilium Convallium  
6 Limbo  
21 Limonium  
20 Limodorum  
Linugrostis  
Linaria  
6 Lingua cervina  
21 Linum  
13 Lithophyton  
10 Lithospermum  
6 Lonchitis  
2 Lotus  
11 Lunaria  
6 Lupinus  
16 Lupulus  
5 Luteola  
15 Lychnis  
5 Lycoperdon  
13 Lycopersicon  
21 Lycopus  
15 Lysimachia

## M.

**M** Adrepora  
Majorana  
2 Malacoides  
5 Malva  
6 Malus  
4 Mandragora  
Marrubiastrum  
12 Marrubium  
14 Matricaria  
2 Mays  
20 Medica  
19 Medicago  
7 Melampyrum  
5 Melianthus  
9 Melilotus  
5 Melissa  
6 Melongena  
ibid. Melopepo  
19 Mentha  
Menyanthes  
Mercurialis  
6 Messilus  
1 Meum  
Miliun  
15 Millefolium  
13 Mimosa  
4 Mitella  
13 Moldavica  
15 Molucca  
12 Momordica  
19 Morus  
7 Moschatellina  
10 Murcuja  
4 Muscari  
21 Muscus



Myagrurn  
Myosotis  
Myrrhis  
Myrtus

N.

Napus  
Narcissus  
Nasturtium  
Nelumbo  
Nerion  
Nicotiana  
Nidus avis  
Nigella  
Nux  
Nymphaea

O.

Ochrus  
Ocimum  
Oenanthe  
Olea  
Omphalodes  
Onagra  
Onobrychis  
Ophioglossum  
Ophris  
Opulus  
Opuntia  
Orchis  
Oreoselinum  
Origanum  
Ornithogalum  
Ornithopodium  
Orobanche  
Orobis  
Oryza  
Osmunda  
Oxys

P.

POEonia  
Paliurus  
Panicum  
Papaver  
Parietaria  
Parnassia  
Paronychia  
Pastinaca  
Pedicularis  
Pelecinus  
Pentaphyllodes  
Pepo  
Periclymenum  
Periploca  
Persica  
Persicaria  
Pervinca  
Petasites  
Peucedanum  
Phalangium  
Phaseolus  
Phellandrium  
Phillyrea  
Phlomis  
Phytolacca  
Pimpinella  
Pinguicula  
Pinus

Pag.

Pisum  
Plantago  
Platanus  
Plumbago  
Poinciana  
Polemonium  
Polium  
Polygala  
Polygonatum  
Polygonum  
Polypodium  
Populago  
Populus  
Porrum  
Portulaca  
Potamogeton  
Primula veris  
Prunus  
Pseudo-acacia  
Pseudodictamnus  
Psyllium  
Ptarmica  
Pulmonaria  
Pulsatilla  
Punica  
Pyrola  
Pyrus

Q.

Quamochitl  
Quercus  
Quinquefolium

R.

Ranunculus  
Rapa  
Raphanistrum  
Raphanus  
Rapistrum  
Raphinculus  
Rapontium  
Reseda  
Rhabarbarum  
Rhagadiolus  
Rhamnus  
Rhus  
Ricinus  
Rosa  
Rosmarinus  
Ros Solis  
Rubeola  
Rubia  
Rubus  
Ruscus  
Ruta  
Ruta muraria

S.

Salicaria  
Salix  
Salvia  
Sambucus  
Samolus  
Sanicula  
Santolina  
Satureja  
Saxifraga  
Scabiosa  
Scandix

Pag.

Scirpus  
Sclarea  
Scolymus  
Scorpioides  
Scorzonera  
Scrophularia  
Secale  
Securidaca  
Sedum  
Senecio  
Senna  
Serpillum  
Sesamoides  
Sicyoides  
Sideritis  
Siliqua  
Siliquastrum  
Sinapi  
Sinapistrum  
Sisarum  
Sisymbrium  
Sisyrinchium  
Sium  
Smyrnum  
Solanum  
Soldanella  
Sonchus  
Sorbus  
Sparganium  
Spartium  
Spondylium  
Spinachia  
Spiraea  
Spongia  
Stachys  
Staphylondendron  
Statice  
Stachas  
Stramonium  
Syrax  
Suber  
Symphytum  
Syringa

T.

Tageres  
Tamnus  
Tanacetum  
Taxis  
Telephium  
Terebinthus  
Teucrium  
Thalictrum  
Thapsia  
Thlaspi  
Thlaspidium  
Thuya  
Thymbra  
Thymelea  
Thymus  
Thyselinum  
Tilia  
Tinus  
Tithymalus  
Tordylium  
Tormentilla  
Toxicodendron  
Trachelium  
Tragacantha  
Tragopogon

G 2

Trago-



Tragoselinon	Pag. 7	Veratrum	Pag. 6	Uva ursi	Pag. 20
Tribulus	6	Verbascum	2	Vulneraria	10
Trichomanes	16	Verbena	4		
Trifolium	10	Veronica	2	X.	
Triticum	15	Viburnum	20		
Tubera	17	Vicia	10	X Anthium	12
Tubularia	ibid.	Viola	11	Xeranthemum	14
Tulipa	9	Virga aurea	14	Xiphion	9
Turritis	5	Viscum	20	Xylon	1
Tussilago	14	Vitex	ibid.	Xylosteon	20
Typha	15	Vitis	21		
		idea	20		
V.		Ulmaria	6	Z.	
V. Aleriana	2	Ulmus	20	Z Acintha	13
Valerianella	ibid.	Urtica	15	Ziziphus	21

# F I N I S.

## SPHALMATA ILLAPSA.

Pag. 6. Col. I. lin. 2. loco verb. IX. Genera lege IX. Sectiones.  
Pag. 33. Lin. 7. loco Cathartica lege Cathartica.





